

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з дисципліни

«Теорія ймовірностей і математична статистика»

для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

спеціальності 7.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»

Київ – 2015

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (комп'ютерного практикуму) з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» для студ. Видавн.-полігр. ін.-ту / Укл. О.І. Кушлик-Дивульська, Б.Р. Кушлик – К.: НТУУ «КПІ». – 2015. – 161 с.

Рекомендовано Вченою радою

Фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ»

(Протокол № 8 від 24 листопада 2015 р.)

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт (комп'ютерного практикуму)
з дисципліни

«Теорія ймовірностей і математична статистика»

для напряму підготовки 6.030601

«Менеджмент»

спеціальності

«Менеджмент організацій і адміністрування»

для студентів Видавничо-поліграфічного інституту

Укладачі:

*Кушлик-Дивульська Ольга Іванівна
Кушлик Богдан Ростиславович*

Відповідальний

редактор

С. Д. Івасишен, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Рецензент

А.Б. Ільєнко, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Анотація

Наведено перелік лабораторних робіт, які відповідають навчальній програмі дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» напряму підготовки «Менеджмент». Для кожної лабораторної роботи розглянуто теоретичний матеріал, приклади розв'язання основних задач за допомогою теоретичної бази та надано інструкції щодо застосування програмного забезпечення пакету Microsoft Excel. Наведено перелік основних теоретичних питань вказаної теми та підібрано достатній масив завдань для індивідуального виконання лабораторних робіт. Подано необхідний довідковий матеріал.

Для студентів економічних, технічних спеціальностей ВПІ НТУУ «КПІ» та інших факультетів, інститутів, що мають схожу програму підготовки.

Ключові слова: комбінаторика, ймовірність, незалежні випробування, дискретні випадкові величини, неперервні випадкові величини, математичне сподівання, дисперсія, закон розподілу, кореляція, вибірка, точкові та інтервальні оцінки, гіпотеза, критерій згоди.

Abstract

The list of laboratory works corresponding to the studying course of a discipline “Probability theory and mathematical statistics” for “Management” training program had been provided. Each laboratory work consists of theoretical material, examples of typical tasks solutions using the theory, and instructions for Microsoft Excel usage. The list of main theoretical points for the theme is provided and the knowledge base is gathered up as enough to do laboratory work individually. All needed references are also provided.

This work fits for the students of economic and technical specialties of Publishing and Printing Institute of the NTUU “KPI”, also fits for other faculties and institutes having the similar training program.

Key words: combinatorics, probability, independent tests, discrete random variables, continuous random values, mathematical expectations, dispersion, distribution law, correlation, selection, point and interval estimations, hypothesis, accordance criteria.

Аннотация

Дан перечень лабораторных работ, соответствующих научной программе дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» направления подготовки «Менеджмент». Для каждой лабораторной работы рассмотрено теоретический материал, примеры решения основных задач с помощью теоретической базы, даны инструкции по применению программного обеспечения пакета Microsoft Excel. Дан перечень основных теоретических вопросов указанной темы и подобран достаточный массив заданий для индивидуального выполнения лабораторных работ. Подан необходимый справочный материал.

Для студентов экономических, технических специальностей ВПИ НТУУ «КПИ» и других факультетов, институтов, которые имеют похожую программу подготовки.

Ключевые слова: комбинаторика, вероятность, независимые испытания, дискретные случайные величины, непрерывные случайные величины, математическое ожидание, дисперсия, закон распределения, корреляция, выборка, точечные и интервальные оценки, гипотеза, критерий согласия.

Передмова

Теорія ймовірностей та математична статистика – математичні науки, які вивчають закономірності в масових випадкових явищах, і вони є складовою теоретичною основою викладання багатьох економічних, соціологічних та спеціальних дисциплін.

Мета комп’ютерного практикуму полягає в закріпленні знань, одержаних студентами під час вивчення дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика», їх застосуванні для вирішення конкретних практичних завдань із використанням теоретичних знань та на практиці можливостей пакету Microsoft Excel. Виконання лабораторних робіт сприяє формуванню самостійності у аналізі проведених обчислень, дослідженням практичних задач, які є необхідною складовою підвищення технічного рівня підготовки студента. Зміст і структура методичних вказівок відображають новітні тенденції у питаннях навчання та підготовки кваліфікованих спеціалістів.

Лабораторні роботи (комп’ютерний практикум) дисципліни містять короткі теоретичні відомості, приклади розв’язування задач, також індивідуальні відповідні завдання та перелік основних теоретичних питань вказаної теми. Протокол практичної роботи оформлюється у вигляді роздрукованих сторінок формату А4 та електронного файлу.

Типова структура виконаної практичної роботи містить:

титульний аркуш;

основна частина (короткі теоретичні відомості та розв’язані задачі);

додатки – виконані задачі за допомогою пакету Microsoft Excel із описанням.

Лабораторні роботи виконуються в 3-му семестрі стаціонарної форми навчання за програмою напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Ознайомлення, опрацювання за темами відповідних лабораторних робіт дає можливість застосовувати алгоритми Excel для практичного використуваних статистичних задач, які є трудомісткими через значну кількість математичних обчислень. Тому дані вказівки розраховані на широку кількість користувачів, які мають доступ до програмного забезпечення і початкові необхідні знання теорії ймовірностей.

Методичні вказівки доповнюють навчальний посібник «Теорія ймовірності та математична статистика» [8], рекомендований Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Автори вдячні співробітникам кафедри математичної фізики, кафедри математичного аналізу та теорії ймовірності фізико-математичного факультету НТУУ «КПІ» та всім читачам, що висловили свої побажання та зауваження. Також укладачі вдячні студентам груп економічної спеціальності Видавничо-поліграфічного інституту за співпрацю в підготовці задач для лабораторних робіт.

Лабораторна робота № 1

Елементи комбінаторики. Класичне означення ймовірностей. Основні теореми ймовірностей

Мета роботи: Вивчення можливостей пакету Microsoft Excel для розв'язання задач з теорії ймовірностей з використанням елементів комбінаторики, класичного означення ймовірностей та основних теорем ймовірностей.

Теоретичні відомості

Елементи комбінаторики

Як відомо, згідно з класичним означенням ймовірностей, щоб обчислити ймовірність тієї чи іншої випадкової події, необхідно вміти обчислити кількість n усіх елементарних подій (розмір простору елементарних подій Ω) і число m елементарних подій, які сприяють появи випадкової події.

У багатьох випадках для обчислення чисел n і m використовуються наступні елементи комбінаторики: *перестановки, розміщення та комбінації*, які є окремим видом *сполук* елементів певної множини.

Сполуками називаються різні підмножини, утворені з елементів універсальної множини (простору елементарних подій Ω), що відрізняються елементами або порядком цих елементів.

Для обчислення цих сполук в пакеті Excel вбудовані наступні функції: **ФАКТР, ЧИСЛКОМЬ, ПЕРЕСТ**, перші дві з яких знаходяться в категорії функцій *математичні*, а третя – *статистичні*.

Нехай M – множина, що містить n елементів.

Означення. *Розміщенням* із n елементів по k називають довільну впорядковану підмножину з k елементів із множини M .

Два розміщення вважаються різними не тільки тоді, коли складаються з різних елементів, але й тоді, коли вони складаються з одинакових елементів, але відрізняються їхнім порядком.

Кількість розміщень із n елементів по k ($k \leq n$) позначають A_n^k і обчислюють за формулою

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1). \quad (1.1)$$

Означення. *Розміщенням з повтореннями* з n елементів по k називають довільну впорядковану підмножину з k елементів із множини M (елементи не обов'язково різні).

Кількість розміщень із повтореннями з n елементів по k обчислюють за формулою:

$$\overline{A}_n^k = n^k. \quad (1.2)$$

Зauważення. \overline{A}_n^k – це кількість способів, якими можна розкласти k різних предметів в n ящиків.

Означення. Розміщення із n елементів по n називаються *перестановками*.

Різні перестановки відрізняються лише порядком елементів. Кількість перестановок з n елементів дорівнює добутку всіх натуральних чисел від 1 до n

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = n! \quad (1.3)$$

Означення. *Перестановками з повтореннями* називають розміщення з n елементів, які мають однотипні елементи.

Кількість різних перестановок з повторенням, які можна утворити з n елементів, серед яких є k_1 елементів першого типу, k_2 елементів другого типу, ..., k_m елементів m -того типу, дорівнює:

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}. \quad (1.4)$$

Означення. Комбінацією (сполучкою) з n елементів по k називають довільну підмножину з k елементів із множини M , яка відрізняється одна від одної хоча б одним елементом.

Порядок елементів у комбінаціях несуттєвий. Кількість комбінацій з n елементів по k ($k \leq n$) позначають C_n^k та обчислюють за формулою:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (1.5)$$

Означення. Комбінацією з повтореннями з n елементів по k називають довільну множину з k елементів із множини M (елементи не обов'язково різні).

Кількість комбінацій з повтореннями з n елементів по k обчислюють за формулою:

$$\overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}. \quad (1.6)$$

Зauważення. \overline{C}_n^k – це кількість способів, якими можна розкласти k однакових предметів по n ящиках.

Значна кількість комбінаторних задач розв'язується з використанням двох основних правил комбінаторики: *правила суми* та *правила добутку*.

Принцип суми. Нехай $n(A)$, $n(B)$ – кількості елементів скінчених неперетинних множин A та B відповідно. Тоді для множини $C = A \cup B$ кількість елементів

$$n(C) = n(A) + n(B). \quad (1.7)$$

Принцип добутку. Нехай потрібно послідовно виконати k дій, причому першу дію можна виконати n_1 способом, після чого другу дію – n_2 способами і т.д. до k -тої дії, яку можна виконати n_k способами. Тоді всі k дій можна виконати $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$ способами.

Наведені вище правила можуть бути розповсюджені на довільне число сумісно здійснюваних виборів.

Розв'язуючи комбінаторну задачу, перш за все потрібно відповісти на запитання – з яким із основних понять в даній ситуації ми маємо справу? Для цього відповідаємо на два питання:

1. Усі елементи множини використовуються чи ні? Якщо використовуються всі, то це перестановка.
2. Важливий порядок розміщення елементів або ні? Якщо порядок важливий, то це розміщення. У протилежному випадку – комбінація.

Класичне означення ймовірностей

Означення. ***Ймовірністю*** події A називають відношення кількості результатів випробування, сприятливих для A , до кількості всіх рівноможливих і попарно несумісних наслідків випробування:

$$P(A) = \frac{m}{n}. \quad (1.8)$$

Аксіоми ймовірності:

1. Для кожної події $A \subseteq \Omega$ справджується нерівність:

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

2. Ймовірність достовірної події дорівнює 1: $P(\Omega) = 1$.

3. Ймовірність неможливої події дорівнює 0: $P(\emptyset) = 0$.

Приклади виконання завдань

Приклад 1. Скільки перестановок можна утворити із трьох букв А, Б та В?

Розв'язання. Можна утворити шість перестановок: АБВ, АВБ, ВАБ, ВБА, БАВ, ВБА, якщо букви не повторюються, тоді маємо $3! = 6$.

Факторіал можна обчислити, використовуючи функцію Excel **ФАКТР(число)**, яка активізується за допомогою команд

Вставка⇒Функція⇒Математические⇒**ФАКТР**.

Відкриється діалогове вікно (рис. 1.1),




Рис.1.1. Обчислення кількості перестановок

де в поле «число» — потрібно вказати невід’ємне ціле число (n), факторіал якого обчислюється.

Приклад 2. Скільки перестановок можна скласти із трьох букв А, Б і В?

Розв’язання. Із трьох букв А, Б і В можна скласти шість перестановок по дві букви: АБ, БА, АВ, В А, БВ, ВБ. За формулою (1.1) знаходимо $A_n^k = 3 \cdot (3-1) = 6$.

Обчислення числа розміщень можна здійснити за допомогою функції **ПЕРЕСТ**(число; число_выбранных), яку викликають за допомогою команд Вставка⇒Функція⇒Статистические⇒ПЕРЕСТ.

Відкриється діалогове вікно (рис.1.2), де в поле «число» — необхідно вказати невід’ємне ціле число, яке задає кількість елементів (n), а в поле «число_выбранных» — ціле число, що задає кількість елемент у кожному розміщенні (k).




Рис. 1.2. Обчислення розміщень

Приклад 3. Скільки комбінацій по дві букви можна скласти із трьох букв А, Б і В?

Розв’язання. Із трьох букв А, Б і В по дві букви, без врахування порядку розташування, можна скласти всього три комбінації: АБ, АВ, БВ. За формулою

$$(1.5) \text{ знаходимо: } C_3^2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3.$$

Обчислення числа комбінацій можна обчислити за допомогою функції **ЧИСЛОКОМБ** (число;число_выбранных) (рис. 1.3), яку викликають послідовністю команд

Вставка⇒Функція⇒Математические⇒ЧИСЛОКОМБ.

В діалоговому вікні «Аргументы функции» в поле «число» – вписують невід’ємне ціле число, яке задає кількість елементів (n), в поле «число_выбранных» – ціле число, що задає кількість елементів у кожній комбінації (k).




Рис. 1.3. Обчислення кількості комбінацій

Приклад 5. Маємо дев'ять однакових карток, на кожній з яких записано одну з цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Навмання беруть чотири картки і розкладають в один рядок. Яка ймовірність того, що при цьому дістанемо 1, 9, 7, 3?

Розв'язання. Кількість елементарних подій множини Ω . буде $n = A_9^4$. Кількість елементарних подій, що сприяють появлі 1, 9, 7, 3(подія B) дорівнює одиниці ($m=1$). Тоді $P(B) = \frac{m}{n} = \frac{1}{A_9^4} = \frac{1}{3024}$. Число n обчислено за допомогою функції **ПЕРЕСТ(9;4)**.

Приклад 7. У шухляді міститься 10 однотипних деталей, 6 із яких є стандартними, а решта – бракованими. Навмання із шухляди беруть чотири деталі. Обчислити ймовірність таких випадкових подій:

A – усі чотири деталі виявляться стандартними;

B – усі чотири деталі виявляться бракованими;

C – із чотирьох деталей виявляться дві стандартними і дві бракованими.

Розв'язання. Кількість усіх елементарних подій

$$n = C_{10}^4 = \text{ЧИСЛОКОМБ}(10;4) = 210;$$

кількість елементарних подій, що сприяють події A :

$$m_1 = C_6^4 = \text{ЧИСЛОКОМБ}(6; 4) = 15;$$

кількість елементарних подій, що сприяють події B :

$$m_2 = C_4^4 = \text{ЧИСЛОКОМБ}(4; 4) = 1;$$

кількість елементарних подій, що сприяють події C :

$$m_3 = C_6^4 \cdot C_4^2 = \text{ЧИСЛОКОМБ}(6; 2) \cdot \text{ЧИСЛОКОМБ}(4; 2) = 15 \cdot 6 = 90.$$

Імовірності цих подій будуть:

$$P(A) = \frac{m_1}{n} = \frac{15}{210} = \frac{1}{14}, \quad P(B) = \frac{m_2}{n} = \frac{1}{210}, \quad P(C) = \frac{m_3}{n} = \frac{90}{210} = \frac{3}{7}.$$

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

Користуючись елементами комбінаторики та програмою Excel розв'язати наступні задачі:

1. *Завдання 1, завдання 2* (додаток 1) (номер варіанту згідно порядкового номера за списком групи) двома способами:
 - за допомогою формул комбінаторики;
 - із використанням функцій Excel.
2. *Завдання 1* (додаток 1) виконати із використанням функцій пакету Excel **ГИПЕРГЕОМЕТ** (*Число_успехов_в_выборке; Размер_выборки; Число_успехов_в_совокупности; Размер_совокупности*). Порівняти отримані результати.

Теоретичні запитання до теми

1. Що називається сполучками елементів певної множини?
2. Які сполучки елементів певної множини називаються перестановками, розміщеннями та комбінаціями?
3. За якими формулами обчислюються перестановки, розміщення та комбінації?
4. За якими функціями програми Excel обчислюються перестановки, розміщення та комбінації?

5. Які є два основні правила комбінаторики? Навести приклади.
6. Як визначити, з яким, із основних понять комбінаторики в даній ситуації ми маємо справу?
7. Які події називаються достовірними, неможливими, випадковими? Навести приклади.
8. Яка подія називається елементарною; складеною елементарною подією? Навести приклади.
9. Які події називаються сумісними, несумісними, рівноможливими ?
10. Дати класичне означення ймовірності випадкової події.
11. Що називається простором елементарних випадкових подій? Навести приклади.

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображається зміст, хід роботи та отримані результати. При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівняти отримані результати проведених обчислень, а також знати відповіді на теоретичні запитання.

Лабораторна робота № 2

Послідовні незалежні випробування. Формула Бернуллі

Мета роботи: Вивчення можливостей пакету Microsoft Excel для розв'язання задач, пов'язаних із серією незалежних випробувань та основних граничних теорем формули Бернуллі.

Теоретичні відомості

Схема Бернуллі

Означення. Якщо n незалежних випробувань проводити в однакових умовах і ймовірність появи події A в усіх випробуваннях однаєва та не залежить від настання або ненастання A в інших випробуваннях, то таку послідовність випробувань називають **схемою Бернуллі**.

Ймовірність того, що подія A ($P(A) = p$) в n спробах з'явиться рівно k разів, а в решті $n - k$ спроб з'явиться протилежна подія \bar{A} , $P(\bar{A}) = q$ ($p + q = 1$), за теоремою множення ймовірностей незалежних подій дорівнює $p^k \cdot q^{n-k}$. При цьому подія A в n спробах може з'явитися рівно k разів в різних комбінаціях, число яких C_n^k . Оскільки всі комбінації подій є подіями несумісними і не важливо, в якій послідовності з'явиться подія A або подія \bar{A} , то, застосовуючи теорему додавання ймовірностей несумісних подій, отримаємо **формулу Бернуллі**

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}. \quad (2.1)$$

Отже, ймовірність $P_n(k)$ того, що подія A настане k разів в n випробуваннях ($0 \leq k \leq n$) обчислюють за **формулою Бернуллі**:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Число k_0 , при якому ймовірність $P_n(k_0)$ найбільша, називають **найімовірнішим** числом настання події A . Його визначають співвідношенням

$$np - q \leq k_0 \leq np + p$$

або

$$(n+1)p - 1 \leq k_0 \leq (n+1)p. \quad (2.2)$$

Число k_0 повинно бути цілим. Якщо $(n+1)p$ – ціле число, тоді найбільше значення ймовірності $P_n(k)$ має при двох числах $k_1 = (n+1)p - 1$ та $k_2 = (n+1)p$.

Зauważення. Ймовірність появи події A в n випробуваннях схеми Бернуллі **менш ніж m разів** знаходять за формулою

$$P_n(k < m) = P_n(0) + P_n(1) + \cdots + P_n(m-1).$$

Імовірність появи події A **не менш ніж m разів** знаходять за формулою $P_n(k \geq m) = P_n(m) + P_n(m+1) + \cdots + P_n(n)$ або за такою формулою

$$P_n(k \geq m) = 1 - \sum_{k=0}^{m-1} P_n(k).$$

Імовірність появи події A **хотя б один раз у n випробуваннях** доцільно обчислювати за формулою

$$P_n(1 \leq m \leq n) = 1 - q^n.$$

Границі теореми формули Бернуллі

Якщо проводяться випробування за схемою Бернуллі та числа n і k великі, то обчислення ймовірності за формулою Бернуллі викликає певні труднощі. У таких випадках для обчислення цих імовірностей застосовують асимптотичні (наблизені) формули, які випливають із локальної та інтегральної **теорем Муавра-Лапласа та граничної теореми Пуассона**. Назва «границя» в обох випадках пов’язана з тим, що ці теореми встановлюють поведінку ймовірності $P_n(k)$ або $P_n(k_1 \leq k \leq k_2)$ за певних умов, до яких обов’язково входить умова $n \rightarrow \infty$.

З огляду на це, за досить великих значень n та за достатньо малих p замість формули Бернуллі часто використовують наблизені асимптотичні формули.

Формула Пуассона

Теорема (теорема Пуассона). Якщо $n \rightarrow \infty$, i — так, що $np \rightarrow \lambda$, $0 < \lambda < \infty$, то

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (2.3)$$

для будь-якого постійного $k = 0, 1, 2, \dots$.

Наслідок. Ймовірність появи події A k разів в n випробуваннях схеми Бернуллі знаходять за наближеною **формулою Пуассона**

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (2.4)$$

де $\lambda = np$.

Ця формула дає досить точне наближення при значеннях p , близьких до нуля ($p < 0,1$), тобто для подій, що рідко трапляються і для достатньо великих n ($npq \leq 9$).

Локальна теорема Муавра-Лапласа

Теорема (локальна теорема Муавра-Лапласа). Якщо ймовірність p появи події A в кожній спробі стала i така, що $0 < p < 1$, то ймовірність числа k появ події A в n спробах обчислюється за наближеною рівністю

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right), \text{ де } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad (2.5)$$

Формула (2.5) дає добре наближення, якщо n достатньо велике, p та q не дуже близькі до нуля, $npq > 9$.

Інтегральна теорема Муавра-Лапласа

Теорема (інтегральна теорема Муавра-Лапласа). Ймовірність того, що в n незалежних випробуваннях схеми Бернуллі, в яких подія A може відбутись з ймовірністю p , подія A відбудеться не менше k_1 та не більше k_2 разів, наближено рівна:

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right), \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (2.6)$$

Формула (2.6) дає добре наближення, якщо n достатньо велике, p та q не дуже близькі до нуля, $npq > 9$. Для всіх значень $x \geq 5$ можна вважати $\Phi(x) \approx 0,5$.

Користуючись формuloю Бернуллі, її граничними теоремами та програмою Excel розв'язати наступні задачі:

Приклад 1. Імовірність влучити в мішень при одному пострілі дорівнює 0,8. Знайти найімовірніше число влучень із 6 пострілів та відповідну ймовірність.

Розв'язання. Знайдемо величину виразу $np + p = 0,8 \cdot 6 + 0,8 = 5,6$ – не ціле число. Тоді найбільше ціле число, яке не перевищує 5,6, дорівнює 5. Таким чином, найбільш імовірне ціле число влучень $k_0 = 5$. Ймовірність п'яти влучень із шести пострілів обчислюємо за формuloю Бернуллі

$$P_6(5) = C_6^5 \cdot 0,8^5 \cdot 0,2 = 0,39.$$

Використаємо функцією Excel категорії «Статистические» **БИНОМРАСП** (*число_успехов; число_испытаний; вероятность_успеха; интегральная*) : *число_успехов = 5; число_испытаний = 6; вероятность_успеха = 0,8; интегральная –0*.

Відповідь. $k_0 = 5$, $P_6(5) = 0,39$.

Приклад 2. Імовірність влучити в мішень при одному пострілі дорівнює 0,8. Знайти ймовірність того, що із 100 пострілів число влучень буде: а) точно 90; б) лежить у межах від 75 до 85.

Розв'язання. Згідно з умовою задачі $np = 80 > 5$ і $nq = 20 > 5$, тому можна скористатися формулами Муавра-Лапласа.

а) За локальною формuloю Муавра-Лапласа знаходимо:

$$x = \frac{90 - 0,8 \cdot 100}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{10}{4} = 2,5.$$

Для $x = 2,5$ знаходимо $\varphi(x) = 0,0175$ і відповідно $P_{100}(90) = \frac{0,0175}{4} = 0,004$.

б) За інтегральною формулою Муавра-Лапласа знаходимо:

$$x_1 = \frac{75 - 80}{4} = -1,25; \quad x_2 = \frac{85 - 80}{4} = 1,25.$$

Для $x = 1,25$ знаходимо $\Phi(1,25) = 0,39435$. Тоді $\Phi(-1,25) = -0,39435$.

Шукану ймовірність знаходимо як різницю

$$P_{100}(75 < k < 85) = \Phi(1,25) - \Phi(-1,25) = 0,39435 - (-0,39435) = 0,79.$$

Відповідь. а) 0,004; б) 0,79.

Зauważення. Можна також проводити обчислення із використанням тієї ж функції Excel категорії «Статистические» **БИНОМРАСП** (*число_успехов;* *число_испытаний;* *вероятность_успеха;* *интегральная*), де для пункту а) *интегральная* – 0, а для пункту б) *интегральная* – 1 (повертає значення: кількість успішних випробувань не менше значення аргументу *число_испытаний*), тобто обчислюють два значення функції для $k = 75, k = 85$ та знаходять їх різницю.

Приклад 3. Словник має 1500 сторінок. Імовірність друкарської помилки на одній сторінці дорівнює 0,001. Знайти ймовірність того, що в словнику: а) буде точно 3 помилки; б) не буде жодної помилки; в) буде хоча б одна помилка.

Розв’язання. а) За умовою ймовірність друкарської помилки на одній сторінці $p = 0,001 < 0,01$, а добуток

$$prq = 1500 \cdot 0,001 \cdot 0,999 = 1,49 < 5 \quad (pr = 1500 \cdot 0,001 = 1,5 < 20).$$

Тоді за формулою Пуассона (за таблицею додатку) обчислюємо

$$P_{1500}(3) = \frac{1,5^3}{3!} \cdot e^{-1,5} \approx 0,125.$$

Скористаємося функцією Excel **ПУАССОН** (x ; *среднее*; *интегральная*); для таких параметрів: x – k – змінна величина, яка приймає значення: $0,1,2,\dots,n$; *среднее* – середнє значення $\lambda = n \cdot p$; *интегральная* – 0 або 1. В умові задачі $k = 3$; *среднее* $\lambda = 1,5$; *интегральная* – 0, тобто обчислення точної кількості подій – 3 помилки .

б) Імовірність того, що в словнику не буде жодної помилки, тобто $k = 0$, обчислюємо за тією ж формулою Пуассона

$$P_{1500}(0) = \frac{1,5^0}{0!} \cdot e^{-1,5} = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{e^3}} \approx \frac{1}{4,48} \approx 0,223.$$

в) подія A – у словнику буде хоча б одна помилка, є протилежною до події – у словнику немає жодної помилки. Тому

$$P(A) = 1 - P_{1500}(0) = 1 - 0,223 = 0,777.$$

Відповідь. а) 0,125; б) 0,223; в) 0,777.

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

1. Користуючись теоретичними знаннями та засобами програмного забезпечення Excel, розв'язати завдання 3 (додаток 1).

2. Розв'язати наступні задачі (номери задач за варіантами у викладача).

Номер варіанту	Номери завдань	Номер варіанту	Номери завдань
1	2.1, 2.4, 2.12	6	2.10, 2.11, 2.19
2	2.2, 2.6, 2.15	7	2.13, 2.2, 2.18
3	2.3, 2.8, 2.14	8	2.3, 2.4, 2.15
4	2.5, 2.7, 2.16	9	2.6, 2.8, 2.19
5	2.9, 2.17, 2.20	10	2.9, 2.17, 2.14,

(варіант 11= 1, 12=2 і т.д.)

2.1. Серед великого числа виробів, що знаходяться в комплекті, 30 % – нестандартні. Знайти ймовірності того, що серед 5 виробів, навмання взятих із комплекту, буде: а) тільки один нестандартний; б) принаймні один нестандартний.

2.2. Імовірність того, що кожен клієнт, який звернувся в авіакасу, замовить квиток до аеропорту N , дорівнює 0,1. Знайти ймовірності того, що із 100 клієнтів, що звернулися в касу, замовлять квиток до аеропорту N : а) менше 15 чоловік; б) від 5 до 12 чоловік; в) більше 20 чоловік.

2.3. На біржі виставлено 10 цінних паперів. Ймовірність того, що вони подорожчають протягом одного дня, дорівнює 0,6. Знайти ймовірності того, що подорожчає: а) рівно 5 паперів; б) не більше ніж 4 папери; в) від 3 до 5 цінних паперів.

2.4. Авіакомпанія виконує протягом місяця 400 рейсів. Ймовірність повного комерційного завантаження кожного рейсу дорівнює 0,8. Знайти ймовірності того, що протягом місяця з повним комерційним завантаженням буде виконано: а) не менше 300 рейсів; б) більша частина рейсів.

2.5. За статистичними даними у середньому 1% пасажирів відмовляється від рейсу. Знайти ймовірності того, що з 300 пасажирів, що мають квитки на рейс, відмовляться від польоту: а) не більше 5 пасажирів; б) не менше 3 пасажирів.

2.6. Інвестор укладає договір на фондовій біржі. Ймовірність укладання однієї угоди за день дорівнює 0,7. Виходячи із припущення, що за 10 робочих днів укладається не більше однієї угоди в день, знайти ймовірності подій: а) буде укладено 7 угод; б) буде укладено не менше 8 угод; в) жодної угоди не буде укладено.

2.7. Кількість помилок у рахунках торгових підприємств складає 5 %. Аудитор перевіряє 10 навмання вибраних рахунків. Якщо не виявиться жодної помилки, то рахунки підприємства далі не перевіряються. Яка ймовірність того, що в 10 рахунках підприємства: а) не буде жодної помилки; б) буде 3 помилки; в) буде від 3 до 5 помилок.

2.8. Телефонна станція обслуговує 2000 абонентів. Ймовірність того, що будь-який абонент зателефонує на станцію протягом години, дорівнює 0,001. Знайти ймовірності того, що протягом години на телефонну станцію зателефонують: а) 5 абонентів; б) не більше 3 абонентів.

2.9. Ймовірність того, що інвестиційний проект принесе через рік прибуток, дорівнює 0,8. Знайти ймовірності того, що з 15 інвестиційних проектів: а) 10 проектів виявляться прибутковими; б) не менше 8 проектів виявляться прибутковими; в) від 5 до 9 проектів будуть прибутковими.

2.10. Фабрика випускає 75 % продукції першим сортом. Знайти ймовірність того, що з 300 виробів, виготовлених фабрикою, число першосортних виробів буде: а) не менше 250; б) від 220 до 235; в) не більше 200.

2.11. За статистичними даними 30 % усіх затримок рейсів авіакомпанії відбувається з вини служби перевезень. Протягом тижня з різних причин із затримкою було виконано 12 рейсів. Знайти найбільш ймовірне число рейсів, затриманих із вини служби перевезень і обчислити відповідну ймовірність.

2.12. При перевезенні скляних виробів в середньому 0,05 ,% від їх числа пошкоджується. Знайти ймовірності того, що при перевезенні 1000 виробів будуть пошкоджені: а) рівно 3 вироби; б) не більше 3 виробів; в) хоча б один виріб.

2.13. Близько 40 % клієнтів банку використовують спеціальні кредитні картки. Знайти ймовірність того, що з 25 клієнтів банку, картки використовують: а) рівно 12 клієнтів; б) не менше 10 клієнтів; в) від 15 до 20 клієнтів.

2.14. За даним аеропорту в листопаді через метеорологічні умови відкладається 10 % рейсів. Знайти ймовірності того, що з 400 рейсів, запланованих на листопад, буде відкладено: а) 50 рейсів; б) від 30 до 50 рейсів; в) не більше 30 рейсів.

2.15. Вибрали навмання 200 акцій. Імовірність того, що акція принесе збитки, дорівнює 0,025. Знайти ймовірність того, що серед акцій виявляться збитковими: а) не більше 3 акцій; б) жодної акції; в) більше 4 акцій.

2.16. Імовірність того, що в бухгалтерському звіті є помилка, дорівнює 0,04. Для перевірки аудитор бере 100 документів. Знайти ймовірність того, що при перевірці документів помилки будуть виявлені: а) в 50 документах; б) від 10 до 20 документах; в) від 40 до 60 документів.

2.17. На біржі виставлено 100 цінних паперів. Імовірність того, що вони подорожчають протягом одного дня, дорівнює 0,06. Знайти ймовірність того, що подорожчає: а) рівно 50 паперів; б) не більше ніж 40 паперів; в) від 30 до 60 цінних паперів.

2.18. Завод відправив на базу 500 виробів. Імовірність пошкодження кожного виробу при перевезенні дорівнює 0,001. Знайти ймовірності

пошкодження при перевезенні: а) рівно 3 виробів; б) менше 3 виробів; в) принаймні одного виробу.

2.19. У фірмі по продажу комп'ютерів 0,5 % деталей, наведених у каталогі, знаходяться на допоміжному складі фірми і треба кілька днів для їх доставки. Знайти ймовірність того, що з 1000 навмання замовлених деталей на допоміжному складі: а) знаходиться не більше 3 деталей; б) знаходиться не менше 6 деталей; в) немає жодної деталі.

2.20. В автопарку 12 автобусів. Ймовірність виходу на лінію кожного з них дорівнює 0,8. Знайти ймовірність нормальної роботи автопарку в найближчий день, якщо для цього потрібно мати на лінії 8 машин.

Теоретичні запитання до теми

1. Яку послідовність незалежних випробувань називають схемою Бернуллі?
2. Записати і пояснити формулу Бернуллі.
3. Як визначають найімовірніше число настання події в серії незалежних випробувань?
4. У яких випадках використовують формулу Пуассона?
5. За яких умов локальна формула Муавра-Лапласа дає добре наближення?
6. Коли використовують інтегральну формулу Муавра-Лапласа?
7. Пояснити на прикладі задачі використання функцій Excel.

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображаються формулі теоретичної частини, хід роботи та отримані результати. При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівняти отримані результати проведених обчислень, а також знати відповіді на теоретичні запитання. Також студент здає електронний варіант проведених обчислень практичних задач.

Лабораторна робота № 3

Закони розподілу та числові характеристики дискретних випадкових величин

Мета роботи: Вивчення основних законів розподілу дискретних випадкових величин та застосування табличного процесору Microsoft Excel для розв'язування задач теорії ймовірностей з використанням цих законів.

Теоретичні відомості

Закони розподілу випадкових величин, їх задання

Означення. *Випадковою величиною* називають таку величину, яка внаслідок випробування може набути лише одне числове значення, заздалегідь невідоме і обумовлене випадковими причинами.

Отже, *випадковою величиною*, пов'язаною з даним дослідом, називають величину, яка при кожному здійсненні досліду може приймати те, чи інше числове значення, залежно від випадку.

Між випадковими подіями і випадковими величинами існує тісний зв'язок. Випадкова подія є якісною характеристикою випадкового результату досліду, а випадкова величина – його кількісною характеристикою. Випадкові величини за своїм характером поділяються на *дискретні* і *неперервні*.

Означення. *Дискретною випадковою величиною (ДВВ)* називають таку величину, яка внаслідок випробування набуває скінченну або злічену кількість значень з відповідними ймовірностями.

Всі можливі значення дискретної випадкової величини можуть бути перенумеровані

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots .$$

Іншими словами, вона має властивість, що кожне з її можливих значень має окіл, який вже не містить жодного з інших значень цієї ж величини.

Означення. *Неперервною випадковою величиною (НВВ)* називають величину, яка може набувати будь-яке числове значення з деякого обмеженого

інтервалу (a, b) або необмеженого інтервалу $(-\infty, +\infty)$. Наприклад, випадкова величина X – час безвідмової роботи приладу є неперервною, оскільки її можливе значення $t > 0$.

Означення. Співвідношення, яке встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і ймовірностями, з якими приймаються ці значення, називається законом розподілу ймовірностей випадкової величини.

Для дискретної випадкової величини X закон розподілу може бути заданий таблично або графічно.

В першому випадку закон розподілу називається *рядом розподілу ймовірностей* випадкової величини X .

Таблиця 3.1

X	x_1	x_2	\dots	x_n	\dots
P	p_1	p_2	\dots	p_n	\dots

В першому рядку таблиці записують всі можливі значення випадкової величини, а в другому – відповідні їм ймовірності. Оскільки події $\{X = x_1\}, \{X = x_2\}, \dots, \{X = x_n\}$ становлять повну групу несумісних подій, то за теоремою додавання ймовірностей маємо

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1,$$

тобто сума ймовірностей всіх можливих значень випадкової величини дорівнює одиниці.

Графічне зображення закону розподілу називається *многокутником розподілу*: по осі абсцис відкладаємо можливі значення x_k випадкової величини X , а по осі ординат – ймовірності p_k цих значень; точки (x_k, p_k) послідовно з'єднуємо відрізками прямих.

Закон розподілу неперервної випадкової величини може бути заданий графічно або аналітично $y = f(x)$ (за допомогою формули). Табличне задання неможливе, оскільки ймовірність отримати будь-яке певне значення неперервної величини дорівнює нулеві, що пов'язане не з неможливістю самої

події (попадання в певну точку на числовій осі), а з нескінченно великою кількістю можливих випадків.

Тому для неперервних випадкових величин (як, зрештою, і для дискретних) визначають ймовірність попадання в деякий інтервал числової осі.

Імовірність попадання випадкової величини X в інтервал $[a, b]$ визначають як ймовірність події $P(a \leq X < b)$.

Для кількісної оцінки закону розподілу випадкової величини (дискретної або неперервної) задають **функцію розподілу ймовірностей випадкової величини**, яку визначають як імовірність того, що випадкова величина X прийме значення, менше деякого фіксованого числа x і позначають $F(x) = P(X < x)$ або

$$F(x) = P(-\infty < X < x).$$

Функцію розподілу $F(x)$ називають **інтегральною функцією** розподілу ймовірностей випадкової величини.

Розглянемо деякі найважливіші закони розподілу дискретної випадкової величини.

Серед дискретних випадкових величин особливе місце в теорії ймовірностей посідають такі, які набувають лише цілих невід'ємних значень $X = x_k = 0, 1, 2, \dots$

Ці випадкові величини називають ціличисловими.

Основні закони розподілу дискретних випадкових величин

1. **Біномний закон розподілу.** Ціличислова випадкова величина X має біномний закон розподілу, якщо ймовірність її можливих значень обчислюється за формулою Бернуллі.

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n, \quad p + q = 1. \quad (3.1)$$

2. **Закон розподілу Пуассона.** Ціличислова випадкова величина X має закон розподілу Пуассона, якщо ймовірність її можливих значень обчислюється за формулою Пуассона

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (3.2)$$

де $\lambda = np$.

Зauważenie. Розподілу Пуассона визначає ймовірність того, що в серії з великої кількості ($n \rightarrow \infty$) рідкісних випробувань кількість успіхів набуває значення $k (k = 0, 1, \dots)$, $\lambda = np$ – параметр розподілу.

3. *Геометричний закон розподілу.* Цілочислова випадкова величина X має геометричний закон розподілу, якщо ймовірність її можливих значень обчислюється за формулою

$$P(X = k) = pq^{k-1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots, \quad (3.3)$$

де $p = P(A)$ – ймовірність появи події A в кожному випробуванні, $q = 1 - p$, $X = k$ – кількість випробувань до появи події A в серії незалежних повторних випробуваннях.

Зauważenie. Можливий також випадок, коли перше значення випадкової величини є 0.

4. *Гіпергеометричний закон розподілу.* Цілочислова випадкова величина X має гіпергеометричний закон розподілу, якщо ймовірність її можливих значень обчислюється за формулою

$$P(X = m) = \frac{C_k^m \cdot C_{N-k}^{n-m}}{C_N^n}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n, k \geq n.$$

Він вказує ймовірність появи m елементів з певною властивістю серед n елементів, взятих із сукупності N елементів, яка містить k елементів саме такої властивості.

Цей розподіл використовують у багатьох задачах статистичного контролю якості.

Зauważenie. Якщо обсяг вибірки n малий у порівнянні з обсягом N сукупності, тобто

$$\frac{n}{N} \leq 0,1; \quad \frac{n}{k} \leq 0,1; \quad \frac{n}{N-k} \leq 0,1,$$

то ймовірності у гіпергеометричному розподілі будуть близькими до відповідних ймовірностей біномного розподілу з $p = \frac{k}{N}$. У статистиці це означає, що розрахунки ймовірностей для вибірки без повторення будуть мало відрізнятися від розрахунків ймовірностей для повторної вибірки.

Числові характеристики законів розподілу

Кожен закон розподілу випадкової величини доповнюється кількісними показниками, які називають ***числовими характеристиками*** цього розподілу. Вони узагальнено характеризують випадкову величину. Найбільш часто використовують три числові характеристики: ***математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення***.

Означення. ***Математичним сподіванням дискретної випадкової величини*** X називають суму добутків всіх можливих значень випадкової величини та їх ймовірностей

$$M(X) = \sum_k x_k p_k. \quad (3.4)$$

Якщо при цьому множина можливих значень X є нескінченною, то накладається умова абсолютної збіжності ряду.

Математичне сподівання називають центром розсіювання випадкової величини і воно відповідає середньому значенню випадкової величини.

Означення. ***Дисперсією*** випадкової величини називають математичне сподівання квадрата різниці випадкової величини і її математичного сподівання:

$$D(X) = M(X - M(X))^2. \quad (3.5)$$

Теорема. ***Дисперсія випадкової величини дорівнює різниці між математичним сподіванням квадрата цієї величини і квадратом її математичного сподівання:***

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2. \quad (3.6)$$

Формула для розрахунку дисперсії дискретної випадкової величини має такий вигляд:

$$D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i. \quad (3.7)$$

Означення. Числову характеристику закону розподілу випадкової величини

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}, \quad (3.8)$$

називають *середньоквадратичним відхиленням* або *стандартним відхиленням*.

Справедливі формулі обчислення основних числових характеристик для основних законів розподілу ймовірностей.

Біномний закон розподілу:

$$M(X) = np, \quad D(X) = npq, \quad \sigma(X) = \sqrt{npq}. \quad (3.9)$$

Закон розподілу Пуассона:

$$M(X) = np = \lambda, \quad D(X) = \lambda, \quad \sigma(X) = \sqrt{\lambda}. \quad (3.10)$$

Геометричний закон розподілу:

$$M(X) = \frac{1}{p}, \quad D(X) = \frac{q}{p^2}, \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{q}}{p}. \quad (3.11)$$

Гіпергеометричний закон розподілу:

$$M(X) = \frac{Ms}{N}; \quad D(X) = \frac{Ms}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(1 - \frac{s-1}{N-1}\right); \quad \sigma(X) = \sqrt{D(X)}. \quad (3.12)$$

В Excel для обчислення ймовірності окремого значення біномного розподілу або значення випадкової величини за заданою ймовірністю використовуються функції **БІНОМРАСП** і **КРИТБІНОМ**. Функція **БІНОМРАСП** використовується для обчислення ймовірності в задачах із фіксованим числом випробувань, коли результатом будь-якого випробування може бути тільки «успіх» або «невдача»; випробування незалежні; ймовірність «успіху» – стала величина протягом усього експерименту. Ця функція використовує параметри і має запис: **БІНОМРАСП** («число успіхів», «число

випробувань», «ймовірність успіху», «інтегральна»), де «число успіхів» – кількість успішних випробувань; «число випробувань» – кількість проведених незалежних випробувань, при цьому кількість випробувань і кількість успіхів – цілі числа; «ймовірність успіху» – ймовірність «успіху» кожного випробування; «інтегральна» – логічне значення, яке визначає форму успіху. Якщо ця величина дорівнює 1 (ІСТИНА), функція **БІНОМРАСП** повертає інтегральну функцію розподілу, тобто обчислює ймовірність того, що кількість успішних випробувань не менше, ніж значення аргументу «число успіхів»; якщо логічне значення дорівнює 0 (ЛОЖЬ), тоді обчислюється значення функції щільності ймовірності, тобто ймовірність того, що кількість успішних випробувань в точності дорівнює значенню аргументу «число успіхів».

Функція **КРИТБІНОМ** обчислює найменше значення кількості успішних випробувань випадкової величини, для якого інтегральний біномний розподіл більший або дорівнює заданій величині (критерію). Ця функція використовується в задачах, пов'язаних з контролем якості.

Аналогічно, можна використовувати також для відповідних розподілів випадкових величин функції **ПУАССОН** та **ГІПЕРГЕОМЕТ** із їхніми параметрами задання.

Приклад 1. По мішені проводяться чотири незалежні постріли. Ймовірність влучення при одному пострілі дорівнює 0,25. Скласти ряд розподілу випадкової величини X – кількості влучень в мішень та обчислити його основні числові характеристики. Визначити функцію розподілу $F(x)$ та побудувати її графік.

Розв'язання. Випадкова величина X – кількість попадань в мішень може приймати значення 0, 1, 2, 3, 4. Оскільки розглядувані випробування задовольняють схемі Бернуллі, то X має біномний закон розподілу. У даному випадку $n = 4$, $p = 0,25$, $q = 1 - p = 0,75$.

Для складання ряду розподілу використаємо функцію Excel категорії «Статистические» **БІНОМРАСП** (*число_успехов;* *число_испытаний;* *вероятность_успеха;* *интегральная*) із такими параметрами: *Число_успехов : k*

— змінна величина, яка приймає значення: 0, 1, 2, 3, 4; Число_испытаний :4 — кількість незалежних випробувань; Вероятность_успеха: 0,25 — ймовірність успіху у кожному випробуванні; Интегральная:0 — для знаходження ймовірності випадкової події $P(X = k)$.

Відповідні ймовірності, знайдені за допомогою даної функції **БИНОМРАСП**, запишемо у вигляді ряду розподілу

k	0	1	2	3	4	Сума
P	0,3164	0,4219	0,2109	0,0469	0,0039	1

В останньому стовпчику знайдена сума $\sum_{k=0}^4 p_k$ для перевірки умови

нормування.

Знайдемо основні числові характеристики розподілу даної випадкової величини: математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення.

Оскільки, у даному випадку, маємо справу із дискретною випадковою величиною, яка має біномний розподіл, то основні числові характеристики можна обчислити за формулами (3.9):

$$M(X) = np = 4 \cdot 0,25 = 1,$$

$$D(X) = npq = 4 \cdot 0,25 \cdot 0,75 = 0,75, \sigma(X) = \sqrt{0,75} = 0,866025.$$

У загальному випадку математичне сподівання дискретної випадкової величини обчислюється за формулою

$$M(X) = \sum_{k=0}^4 x_k p_k = 0 \cdot 0,3164 + 1 \cdot 0,4219 + 2 \cdot 0,2109 + 3 \cdot 0,0469 + 4 \cdot 0,0039 = 1.$$

Для обчислення дисперсії знайдемо $M(X^2)$

$$M(X^2) = \sum_{k=0}^4 (x_k)^2 p_k = 0 \cdot 0,3164 + 1 \cdot 0,4219 + 4 \cdot 0,2109 + 9 \cdot 0,0469 + 16 \cdot 0,0039 = 1,75$$

Звідси

$$D(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = 1,75 - 1^2 = 0,75.$$

Середнє квадратичне відхилення обчислимо за формулою

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,75} = 0,866025.$$

Для функції розподілу випадкової величини скористаємося функцією **БІНОМРАСП** (*число_успехов; число_испытаний; вероятность_успеха; интегральная*) з параметрами: *Число_успехов*: k – змінна величина, яка приймає значення 0, 1, 2, 3, 4; *Число_испытаний*: 4 – кількість незалежних випробувань; *Вероятность_успеха*: 0,25 – ймовірність успіху кожного випробування; *Интегральная*: 1 – для знаходження функції розподілу $F(x)$. Відповідні значення, знайдені за допомогою даної функції, наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

X	0	1	2	3	4
$F(x)$	0,3164	0,7383	0,9492	0,9961	1

Зauważення. При використані функції **БІНОМРАСП** для побудови функції розподілу $F(x)$ потрібно врахувати, що **БІНОМРАСП** повертає значення $P(X \leq x)$, а не $P(X < x)$. Результат застосування табличного процесора Microsoft Excel для розв'язування прикладу 1 наведено на рисунку 3.1.




Рис. 3.1. Вигляд обчислень на екрані

Функція розподілу $F(x)$ має вигляд

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \leq 0; \\ 0,3164, & \text{якщо } 0 < x \leq 1; \\ 0,7383, & \text{якщо } 1 < x \leq 2; \\ 0,9492, & \text{якщо } 2 < x \leq 3; \\ 0,9961, & \text{якщо } 3 < x \leq 4; \\ 1, & \text{якщо } x > 4. \end{cases}$$

а її графік зображене нижче:




Рис. 3.2. Функція розподілу

Приклад 2. Середнє число відвідувачів магазину протягом 10-ти хвилинного інтервалу, дорівнює 2. Поява відвідувачів у магазині відбувається випадково і незалежно один від одного. Потрібно:

- 1) Скласти ряд розподілу числа відвідувачів магазину протягом 10 хвилин і побудувати його графік.
- 2) Знайти числові характеристики цього розподілу.
- 3) Обчислити функцію розподілу числа відвідувачів магазину протягом 10 хвилин.
- 4) Обчислити ймовірність того, що протягом 10 хвилин число відвідувачів магазину виявиться менше 3 і не менше 3.

Розв'язання. Нехай випадкова величина X – кількість відвідувачів магазину протягом 10 хвилин. Дано дискретна випадкова величина може приймати значення $X: 0,1,2,\dots,n$, середнє значення, якої дорівнює 2. Отже, дана величина має закон розподілу Пуассона з $\lambda = 2$ і $X = k = 0,1,2,\dots,n$.

1) Для складання ряду розподілу скористаємось функцією Excel **ПУАССОН** (x ; *среднее; интегральная*); за таких параметрів: $x = k$ – змінна величина, яка приймає значення: $0,1,2,\dots,n$; *среднее*: 2 – середнє значення $\lambda = n \cdot p$; *интегральная*: 0 – для знаходження ймовірності випадкової події $X = k$.

Відповідні ймовірності, знайдені за допомогою даної функції, наведено в табл.3.3, а відповідний графік – на рис. 3.3.

Таблиця 3.3

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p_k	0,1353	0,2707	0,2707	0,1804	0,0902	0,0361	0,0120	0,0034	0,0009	0,0002




Рис 3.3. Многокутник розподілу

Для побудови ймовірнісного многокутника (многокутника розподілу) використано команду «Диаграмма» (*Вставка* \Rightarrow *Диаграмма* \Rightarrow *Точечная...*) з відповідними параметрами.

2) В даному прикладі числові характеристики обчислюються за формулами (3.10):

$$M(X) = np = \lambda = 2, \quad D(X) = \lambda = 2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{2} = 1,4142.$$

3) Функцію розподілу можна обчислити за допомогою функції **ПУАССОН** (x ; *среднее; интегральная*) для параметрів « x » та «*среднее*» як в завданні 1) та «*интегральная*» =1. Результати обчислень наведені в таблиці 3.6. (*Врахувати зауваження в прикладі 1*).

Таблиця 3.4

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$F(x)$	0,1353	0,4060	0,6767	0,8571	0,9473	0,9834	0,9955	0,9989	0,9998	1,0000

4) Імовірність того, що протягом 10 хвилин число відвідувачів магазину виявиться менше 3 можна обчислити за формулою

$P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,1353 + 0,2707 + 0,2707 = 0,6767$,
де числові дані взяті з таблиці. Цей самий результат можна одержати зразу, за $X \leq 2$. Імовірність того, що протягом 10 хвилин число відвідувачів магазину виявиться не менше 3, тобто 3 і більше, можна обчислити за формулою

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - 0,6767 = 0,3133.$$

Приклад 3. Спортсмен стріляє зі спортивної рушниці по одній і тій самій мішенні. Ймовірність влучити в мішень при одному пострілі є величиною сталою і дорівнює 0,8. Стрільба по мішенні ведеться до першого влучення. Скласти таблицю розподілу, побудувати імовірнісний многокутник та визначити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ дискретної випадкової величини X – числа витрачених спортсменом набоїв.

Розв'язання. Випадкова величина X є цілочисловою з геометричним законом розподілу ймовірностей. За умовою задачі: $p = 0,8$, $q = 0,2$. Розподіл випадкової величини X наведено в таблиці 3.5, де значення p_k обчислюються за формулою (3.3). а імовірнісний многокутник – на рисунку 3.4.

Таблиця 3.5

k	1	2	3	4	5	6	7	8
p_k	0,80000	0,16000	0,03200	0,00640	0,00128	0,00026	0,00005	0,00001




Рис.3.4. Многокутник розподілу

За формулами (3.11) обчислюємо числові характеристики:

$$M(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,8} = \frac{5}{4}, \quad D(X) = \frac{q}{p^2} = \frac{0,2}{0,64} = \frac{5}{16}, \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{q}}{p} = \frac{\sqrt{5}}{4}.$$

Приклад 4. Серед дев'яти однотипних виробів п'ять відповідають стандарту, а решта – ні. Навмання береться s виробів. Визначити закон розподілу ціличислової випадкової величини X – кількості появ числа виробів, що відповідають стандарту і обчислити для цієї величини числові характеристики, якщо їх максимальна кількість $s = 4$.

Розв'язання. У даному випадку випадкова величина X задовольняє гіпергеометричному закону розподілу при $N = 9$, $M = 5$, $N - M = 4$ та s , що може приймати різні значення від 0 до 4.

Використаємо формулу (3.4): $p_k = P(X = k) = \frac{C_5^k C_4^{s-k}}{C_9^s}$.

Якщо $s = 4$, $p_k = \frac{C_5^k C_4^{4-k}}{C_9^s}$, де $k = s - (N - M), \dots, s = 0, 1, 2, 3, 4$.

Для побудови функції розподілу скористаємося функцією пакету Excel.

ГИPERГEOMET (*Число_успехов_в_выборке;* *Размер_выборки;*

Число_успехов_в_совокупности; Размер_совокупности), де

Число_успехов_в_выборке: k – змінна величина, яка приймає значення: 0, 1, 2, 3, 4;

Размер_выборки: s – кількість навмання взятих виробів;

Число_успехов_в_совокупности: M – кількість виробів, які сприяють події;

Размер_совокупности: N – загальна кількість виробів.

В таблиці 3.6 наведені гіпергеометричний закон та числові характеристики закону, отримані в Excel

Таблиця 3.6

X	0	1	2	3	4	Сума
p_k	0,007937	0,15873	0,47619	0,31746	0,039683	1
$k \cdot p_k$	0	0,15873	0,952381	0,952381	0,15873	$M(X) = 2,2222$
$(k - M(X))^2 \cdot p_k$	0,039193	0,237115	0,023516	0,192044	0,125416	$D(X) = 0,6172$
						$\sigma(X) = 0,7856$

Аналогічні результати можна одержати, використовуючи формули (3.12):

$$M(X) = \frac{Ms}{N} = \frac{5 \cdot 4}{9} = 2,2222;$$

$$D(X) = \frac{Ms}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(1 - \frac{s-1}{N-1}\right) = \frac{5 \cdot 4}{9} \left(1 - \frac{5}{9}\right) \left(1 - \frac{4-1}{9-1}\right) = 0,6173;$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,61728} = 0,7857.$$

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

Номер варіанту	Номери завдань	Номер варіанту	Номери завдань
1	3.1, 3.11(а), 3.14	6	3.6, 3.11(б), 3.19
2	3.2, 3.12(б), 3.15	7	3.7, 3.12(в), 3.20
3	3.3, 3.11(в), 3.16	8	3.8, 3.11(г), 3.21
4	3.4, 3.12(г), 3.17	9	3.9, 3.13, 3.22
5	3.5, 3.11(д), 3.18	10	3.10, 3.12(а), 3.23

3.1. Завод випускає 96% виробів першого сорту та 4% – виробів другого сорту. Навмання відібрали партію з 100 виробів. Побудувати закон розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини X – кількості виробів другого сорту в цій вибірці, зобразити многокутник розподілу, знайти функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.2. Двічі кидають монету. Нехай дискретна випадкова величина X – кількість випадань герба. Знайти розподіл ймовірностей випадкової величини X , функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ та побудувати многокутник розподілу.

3.3. Під час роботи певного пристрою час від часу виникають збої, які можна вважати випадковими подіями, розподіленими за законом Пуассона. Середнє число збоїв за добу роботи машини дорівнює 1,5. Записати закон розподілу дискретної випадкової величини X – кількості збоїв роботи пристрою за добу. Побудувати многокутник розподілу X , знайти функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.4. Записати закон розподілу дискретної випадкової величини X – кількості появи події A в двох незалежних випробуваннях, якщо $M(X) = 0,8$. Побудувати многокутник розподілу випадкової величини X та знайти функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.5. Радіотелефонна станція отримує цифровий текст. У наслідок атмосферних завад імовірність спотворення цифри в середньому дорівнює 0,001. Було отримано текст, що налічує 2000 цифр. Записати закон розподілу дискретної випадкової величини X – кількості спотворених цифр в отриманому тексті, функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ та побудувати многокутник розподілу.

3.6. Записати закон розподілу дискретної випадкової величини X – кількості появ події в 10 незалежних випробуваннях, в кожному з яких імовірність появи події рівна 0,7. Знайти функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ та побудувати многокутник розподілу.

3.7. Телефонна станція обслуговує 1000 абонентів. Імовірність того, що протягом години абонент розмовлятиме по телефону дорівнює, в середньому, 0,002. Знайти $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ дискретної випадкової величини X – кількості абонентів, що розмовляють протягом години; функцію розподілу ймовірностей та побудувати многокутник розподілу.

3.8. Імовірність влучення в мішень дорівнює 0,5. Стрілок, маючи в запасі 6 патронів, робить постріли по мішені до першого попадання або до використання усіх патронів. Скласти ряд розподілу випадкової величини X – кількості використаних набоїв, побудувати імовірнісний многокутник та знайти функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.9. Серед 12 однотипних телевізорів 8 відповідають вимогам стандарту, а решта – ні. Побудувати закони розподілу дискретної випадкової величини X – кількості телевізорів, що відповідають вимогам стандарту серед s навмання взятих, обчислити $M(X)$, $D(X)$, якщо: 1) $s = 4$; 2) $s = 6$; 3) $s = 8$ та побудувати многокутник розподілу.

3.10. Монету підкидають доти, поки випаде герб. Нехай випадкова величина X – кількість зроблених підкидань. Знайти: а) закон розподілу випадкової величини X ; б) функцію розподілу ймовірностей $F(x)$; в) $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.11. Дисперсія випадкової величини X рівна 5. Знайти дисперсію величин:

а) $X - 1$; б) $-2X$; в) $3X + 6$; г) $7X - 2$; д) $5 - 3X$.

3.12. Дисперсія випадкової величини X рівна 9. Знайти дисперсію величин: а) $2X - 3$; б) $2X + 7$; в) $3X - 1$; г) $1 - 4X$.

3.13. Математичне сподівання та дисперсія випадкової величини X дорівнюють відповідно 2 та 10. Знайти математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $Y = 2X + 5$.

3.14. Побудувати ряд розподілу випадкової величини X – суми числа очок, які можуть з'явитися при киданні двох гральних кубиків. Обчислити $M(X)$ та $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.15. Пристрій складається із чотирьох приладів, які працюють незалежно один від одного. Ймовірності відмови приладів наступні: $p_1 = 0,3$; $p_2 = 0,4$; $p_3 = 0,5$; $p_4 = 0,6$. Знайти закон розподілу випадкової величини X – кількості приладів, які відмовили та обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.16. Стріляють у ціль до першого влучення. Влучення при різних пострілах – незалежні події, ймовірність влучення при кожному пострілі $p = 0,85$. Нехай випадкова величина X – кількість зроблених пострілів. Знайти розподіл випадкової величини X , обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.17. Побудувати ряд розподілу випадкової величини X – кількості попадань м'ячем у кошик при двох киданнях, якщо ймовірність попадання є 0,4. Знати математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення.

3.18. Під час виготовлення деталі робітників необхідно виконати чотири незалежні між собою технологічні операції. Імовірність того, що при виконанні першої операції робітник не допустить дефекту, дорівнює 0,95; для другої, третьої і четвертої операцій ця ймовірність становить відповідно 0,9; 0,85; 0,8.

Побудувати закон розподілу дискретної випадкової величини X – кількості операцій, під час виконання яких робітник не допустить браку.

3.19. Два гральних кубики одночасно підкидують двічі. Написати закон розподілу дискретної випадкової величини X – кількості появ парного числа очок на двох кубиках. Обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.20. На шляху руху автомобіля стоять п'ять світлофорів, кожний із яких з імовірністю 0,5 дозволяє або забороняє рух. Побудувати закон розподілу ймовірностей дискретної випадкової X – кількості світлофорів, що їх автомобіль промине без затримки, та обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.21. Імовірність того, що футболіст реалізує одинадцятиметровий штрафний удар дорівнює 0,9. Футболіст виконав три такі удари. Побудувати закон розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини X – кількості реалізованих штрафних. Обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

3.22. Чотири прилади потрібно перевірити на надійність. Імовірність того, що прилад витримає перевірку на надійність, для кожного дорівнює 0,8. Побудувати закон розподілу дискретної випадкової величини X – кількості приладів, які пройшли випробування.

3.23. На заводі можуть одночасно працювати три однотипних верстати, які вмикаються незалежно. Імовірність того, що в даний момент працює перший, другий чи третій верстат дорівнює 0,2; 0,5; 0,3 відповідно. Записати ряд розподілу для дискретної випадкової величини X – кількості одночасно працюючих верстатів та обчислити $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

Теоретичні запитання до теми

1. Означити випадкову величину та навести приклади.
2. Пояснити відмінність ДВВ від НВВ.
3. Означити закон розподілу ДВВ та пояснити побудову многокутника розподілу і функції розподілу.
4. Записати числові характеристики випадкової величини та формули їх обчислення.

5. Біномний закон розподілу, обчислення його числових характеристик.
6. Закон Пуассона, обчислення його числових характеристик.
7. Геометричний закон розподілу, обчислення його числових характеристик.
8. Гіпергеометричний закон розподілу, обчислення його числових характеристик.

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображаються формули теоретичної частини, розв'язання завдань самостійної роботи та отримані результати (студент здає електронний варіант проведених обчислень практичних задач).

При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівнювати отримані результати проведених обчислень, також знати відповіді на теоретичні запитання.

Додаткові завдання

1. Обчислити числові характеристики одного (на вибір) закону розподілу.
2. За умовою завдання 1 (додаток 1) побудувати закон розподілу ціличислової випадкової величини X – кількості куплених виграшних квитків та обчислити для цієї величини числові характеристики.

Лабораторна робота № 4

Закони розподілу та числові характеристики неперервних випадкових величин

Мета роботи: Використання можливостей пакету Microsoft Excel для розв'язання задач теорії ймовірності з використанням основних законів розподілу неперервних випадкових величин.

Теоретичні відомості

Означення. *Неперервною випадковою величиною (НВВ)* називають величину, якщо сукупність її можливих значень цілком заповнює деякий проміжок чисової осі, який може бути скінченим або нескінченим. Наприклад, випадкова величина X – час безвідмової роботи приладу є неперервною, оскільки її можливе значення $t > 0$.

Закон розподілу неперервної випадкової величини може бути заданий графічно або аналітично $y = p(x) = f(x)$ (за допомогою формули). Табличне задання неможливе, оскільки ймовірність отримати будь-яке певне значення неперервної величини дорівнює нулеві, що пов'язане не з неможливістю самої події (попадання в певну точку на числовій осі), а з нескінченно великою кількістю можливих випадків.

Тому для неперервних випадкових величин (як, зрештою, і для дискретних) визначають ймовірність попадання в деякий інтервал чисової осі.

Імовірність попадання випадкової величини X в інтервал $[a, b]$ визначають як ймовірність події $P(a \leq X < b)$.

Для кількісної оцінки закону розподілу випадкової величини (дискретної або неперервної) задають *функцію розподілу ймовірностей випадкової величини*, яку визначають як імовірність того, що випадкова величина X

прийме значення, менше деякого фіксованого числа x , і позначають $F(x) = P(X < x)$ або $F(x) = P(-\infty < X < x)$.

Функцію розподілу $F(x)$ називають *інтегральною функцією* розподілу ймовірностей випадкової величини.

Знаючи функцію розподілу $F(x)$, можна обчислити ймовірність попадання випадкової величини в деякий інтервал $[a, b]$:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a). \quad (4.1)$$

Оскільки ймовірність того, що випадкова величина X набуде конкретного можливого значення, завжди дорівнює нулю, тобто $P(X = x_k) = 0$, то мають місце рівності

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

Означення. *Диференціальною функцією розподілу* або *щільністю розподілу ймовірностей* неперервної випадкової величини називають

$$f(x) = F'(x). \quad (4.2)$$

Теорема. *Ймовірність того, що неперервна випадкова величина X набуде будь-яке значення з проміжку (a, b) обчислюється за формулою*

$$P(X \in (a, b)) = \int_a^b f(x) dx. \quad (4.3)$$

Наслідок. Функцію розподілу випадкової величини визначають через її функцію щільності $f(x)$ таким чином:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt. \quad (4.4)$$

Умову нормування через функцію щільності записують таким чином:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1.$$

Якщо неперервна випадкова величина X визначена лише на проміжку (a, b) , то умова формування має вигляд $\int_a^b f(t) dt = 1$.

Числові характеристики неперервних випадкових величин

У випадку неперервних випадкових величин математичне сподівання, дисперсія та середнє квадратичне відхилення мають такий самий зміст та властивості, як і для дискретних випадкових величин, але обчислюють їх за іншими формулами.

Математичним сподіванням неперервної випадкової величини X , яка задана щільністю розподілу $f(x)$, називають

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx, \quad (4.5)$$

якщо цей інтеграл абсолютно збіжний. Зокрема, якщо можливі значення неперервної випадкової величини X належать проміжку $[a, b]$, тоді

$$M(X) = \int_a^b xf(x)dx. \quad (4.6)$$

Для обчислення дисперсії використовувати формули:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (M(X))^2; \quad (4.7)$$

якщо її можливі значення належать відрізку $[a, b]$, тоді

$$D(X) = \int_a^b x^2 f(x)dx - (M(X))^2. \quad (4.8)$$

Числову характеристику закону розподілу випадкової величини

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)},$$

називають *середньоквадратичним відхиленням* або *стандартним відхиленням*.

Закони неперервних випадкових числових величин та їх числові характеристики

Найчастіше використовуються наступні закони розподілу.

1. **Рівномірний закон розподілу.** Розподіл ймовірностей називається *рівномірним*, якщо на інтервалі, якому належать всі можливі значення випадкової величини, функція щільності розподілу дорівнює константі.

Випадкова величина X , розподілена рівномірно на проміжку $[a, b]$, має таку функцію щільності розподілу:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a; \\ \frac{1}{b-a}, & a < x \leq b; \\ 0, & x > b. \end{cases} \quad (4.9)$$

Функція розподілу ймовірностей має вигляд

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a; \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b; \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Числові характеристики рівномірного закону:

$$M(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad \sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}. \quad (4.10)$$

2. **Показниковий розподіл.** Випадкову величину X називають розподіленою за **показниковим** розподілом, якщо її щільність розподілу ймовірностей має вигляд

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad (4.11)$$

де $\lambda > 0$ – параметр розподілу.

Показниковий розподіл задовольняється: час телефонної розмови, час ремонту техніки, час безвідмової роботи комп’ютерної мережі.

Якщо випадкова величина X має показниковий розподіл з параметром λ , тоді

$$M(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2}. \quad (4.12)$$

Якщо випадкова величина X розподілена за показниковим розподілом, то її інтегральна функція розподілу має вигляд

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

відповідно

$$P(a < X < b) = \begin{cases} e^{-a\lambda} - e^{-b\lambda}, & a \geq 0, \\ 1 - e^{-b\lambda}, & a < 0, \quad b > 0, \\ 0, & b < 0. \end{cases}$$

Графіки диференціальної та інтегральної функцій показникового розподілу зображені на рис. 4.1 а, б.




Рис. 4.1. Диференціальна та інтегральна функції показникового розподілу

Показниковий розподіл часто зустрічається в теорії масового обслуговування, теорії надійності. Нехай t – час безвідмовної роботи деякого елемента, а λ – інтенсивність відмов (середнє число відмов за одиницю часу). Тоді час t роботи елемента можна вважати неперервною випадковою величиною, розподіленою за показниковим законом із функцією розподілу

$$F(x) = p(t < x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad (\lambda > 0),$$

яка визначає ймовірність відмови елемента за час, який менший x .

Імовірність

$$R(x) = p(t \geq x) = e^{-\lambda x} \tag{4.13}$$

називають **функцією надійності**, яка визначає ймовірність безвідмовної роботи елемента за час x .

3. Нормальний закон розподілу. Нормально розподіленою з

параметрами a та σ називається випадкова величина X , функція щільності розподілу якої має вигляд:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < a < +\infty, \quad \sigma > 0. \quad (4.14)$$

Підпорядкування випадкової величини X нормальному закону розподілу з параметрами a та σ позначають $N(a;\sigma)$. Графік функції щільності нормального розподілу називають **кривою Гаусса** або **нормальною кривою**. Параметри a та σ впливають на форму кривої розподілу $M(X)=a$ та $D(X)=\sigma^2$, де a та σ – параметри розподілу.

Інтегральна функція нормального розподілу має вигляд

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt. \quad (4.15)$$

Розподіл $N(0;1)$ називають **стандартним нормальним розподілом**. В цьому випадку

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0,5 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0,5 + \Phi(x),$$

де $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ – функція Лапласа.

Графіки функцій щільності ймовірності та розподілу наведено відповідно на рис. 4.2 та рис. 4.3.




Рис. 4.2. Диференціальна функція нормального розподілу




Рис. 4.3. Інтегральна функція нормального розподілу

Імовірність того, що нормальну розподілену випадкова величина X прийме значення на проміжку (α, β) визначається за формулою:

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(t)dt = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{\alpha}^{\beta} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) \quad (4.16)$$

Правило «трьох сигм» для нормального закону. Коли $\delta = 3\sigma$, то

$$P(|x-a| < 3\sigma) = 2\Phi\left(\frac{3\sigma}{\sigma}\right) = 2\Phi(3) = 2 \cdot 0,49865 = 0,9973. \quad (4.17)$$

Звідси випливає:

$$P(|x-a| > 3\sigma) = 1 - P(|x-a| < 3\sigma) = 1 - 0,9973 = 0,0027,$$

тобто ймовірність того, що внаслідок проведення експерименту випадкова величина X , яка має розподіл $N(a; \sigma)$, не потрапить в проміжок $[a - 3\sigma; a + 3\sigma]$, дорівнює 0,0027.

Зміст «правила 3σ»: *практично достовірно, що нормальну розподілену випадкова величина може відхилятись від свого математичного сподівання не більше, ніж на потроєне середнє квадратичне відхилення.*

На практиці його використовують так: якщо закон розподілу випадкової величини X невідомий, але $|X - a| < 3\sigma$, тоді можна припустити, що X розподілена нормальну.

Нормальний закон розподілу широко застосовується в математичній статистиці. Головна особливість нормального закону полягає в тому, що він є

граничним законом, до якого наближаються інші закони розподілу за типових умов.

Розв'язування типових прикладів

Приклад 1. Закон розподілу неперервної випадкової величини X задано формулою

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \leq -1; \\ \frac{(x+1)^3}{64}, & \text{якщо } -1 < x \leq 3; \\ 1, & \text{якщо } x > 3. \end{cases}$$

Знайти $f(x)$ та побудувати графіки функцій $f(x)$ і $F(x)$. Обчислити $P(0 < X < 2)$, скориставшись формулами (4.1) та (4.3).

Розв'язання. За означенням

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \leq -1; \\ \frac{3 \cdot (x+1)^2}{64}, & \text{якщо } -1 < x \leq 3; \\ 0, & \text{якщо } x > 3. \end{cases}$$

Графіки функцій $f(x)$ і $F(x)$, побудовані за їх табличними значеннями, зображені відповідно на рис.4.4 та рис.4.5.

x	-1	0	1	2	3	4
$F(x)$	0	0,016	0,016	0,016	0,016	1
$f(x)$	0	0,047	0,188	0,422	0,750	0




Рис.4.4. Диференціальна функція




Рис.4.5. Інтегральна функція

Імовірність події $0 < X < 2$ обчислимо за формулою (4.1)

$$P(0 < x < 2) = F(2) - F(0) = \frac{27}{64} - \frac{1}{64} = \frac{13}{32}.$$

Те саме одержуємо за формулою (4.3)

$$P(0 < x < 2) = \int_0^2 \frac{3 \cdot (x+1)^2}{64} dx = \left. \frac{(x+1)^3}{64} \right|_0^2 = \frac{27}{64} - \frac{1}{64} = \frac{13}{32}.$$

Приклад 2. Диференціальна функція розподілу випадкової величини X має вигляд

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \leq 0; \\ \frac{1}{2} \sin x, & \text{якщо } 0 < x \leq \pi; \\ 0, & \text{якщо } x > \pi. \end{cases}$$

Знайти $F(x)$, побудувати графіки функцій $f(x)$ та $F(x)$. Обчислити $P\left(\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{2}\right)$.

Розв'язання. Згідно з формулою (4.4) маємо:

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{2} \sin t \cdot dt = \frac{1}{2} (-\cos t) \Big|_0^x = \frac{1}{2} (1 - \cos x).$$

Таким чином функція розподілу ймовірності має вигляд

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } x \leq 0; \\ \frac{1}{2} (1 - \cos x), & \text{якщо } 0 < x \leq \pi; \\ 1, & \text{якщо } x > \pi. \end{cases}$$

Графіки функцій $f(x)$ та $F(x)$, побудовані за їх табличними значеннями, зображені відповідно на рис.4.6 і рис.4.7.

x	0,00	0,52	1,05	1,57	2,09	2,64	3,14
$f(x)$	0,00	0,25	0,43	0,50	0,43	0,24	0,00
$F(x)$	0,00	0,07	0,25	0,50	0,75	0,94	1,00





Рис.4.6. Диференціальна функція Рис 4.7. Інтегральна функція



Ймовірність події $P\left(\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}\right)$ можна обчислити згідно за формулою (4.1) або (4.3). За формулою (4.1) маємо

$$P\left(\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = \frac{1}{2} (-\cos t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2} \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

$$\text{За формулою (4.3) будемо мати } P\left(\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}\right) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Приклад 3. Час t безперервної роботи планшета має показниковий розподіл. Знайти ймовірність його безвідмовної роботи протягом 600 годин, якщо середній час його роботи – 400 годин.

Розв'язання. За умовою задачі математичне сподівання випадкової величини t дорівнює 400, тому $\lambda = \frac{1}{M} = \frac{1}{400}$. За формулою (4.13)

$$R(x) = p(t \geq x) = e^{-\lambda x}, \text{ маємо}$$

$$R(x=600) = e^{-\frac{600}{400}} = e^{-1.5} = 0,2231.$$

Отже, ймовірність того, що планшет працюватиме не менше 600 годин, дорівнює 22%.

Приклад 4. Знайти числові характеристики випадкової величини, розподіленої за законом

$$f(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Розв'язання. Для даного показникового розподілу випадкової величини з параметром $\lambda = 4$ за формулами (4.12) маємо:

$$M(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4} = 0,25; \quad D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{16} = 0,0625.$$

Приклад 3. Нормально розподілена випадкової величини X має математичне сподівання $M(X) = 30$ та середньоквадратичне відхилення $\sigma(X) = 10$. Ставиться завдання:

- 1) Записати вигляд диференціальної функції розподілу $f(x)$, побудувати її графік та графік інтегральної функції розподілу $F(x)$.
- 2) Знайти ймовірність того, що внаслідок випробування випадкова величина набуде значення з інтервалів: $(10, 50)$, $(a - 3\sigma, a + 3\sigma)$ (тобто знайти $P(10 < X < 50)$ і $P(a - 3\sigma < X < a + 3\sigma)$).

Розв'язання. 1) Згідно умови задачі $a = 30$, $\sigma = 10$, тому за формулою щільності розподілу (4.14)

$$f(x) = \frac{1}{10\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\beta} e^{-\frac{(x-30)^2}{2 \cdot 10^2}} dx = \frac{1}{10\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\beta} e^{-\frac{(x-30)^2}{200}} dx.$$

Для побудови графіка функції $f(x)$ знайдемо значення у точках $x = 5, 10, \dots, 50$, використовуючи функцією пакету Excel, яка має вигляд:

НОРМРАСП(x ; среднее; стандартное_откл; интегральная), де x – значення, для якого будується розподіл; *среднее* – математичне сподівання $M(X)$; *стандартное_откл* – середнє квадратичне відхилення $\sigma(X)$; *интегральная* – логічне значення 0 або 1. (Якщо «интегральная»: – 0, отримаємо значення диференціальної функції розподілу $f(x)$ в точці x , якщо «интегральная»: 1 – функція повертає значення інтегральної функції розподілу $F(x)$ в точці x).

Для побудови графіка функції $F(x)$ знайдемо її значення у тих же точках $x = 5, 10, \dots, 50$, використовуючи функцію **НОРМРАСП**($x; M(X); \sigma(X); 1$).

2) Використовуючи формулу (4.3), одержимо:

$$P(10 < X < 50) = \int_{10}^{50} f(t) dt = \Phi\left(\frac{50-30}{10}\right) - \Phi\left(\frac{10-30}{10}\right) = 2\Phi(2) = 0,9544,$$

де $\Phi(2)$ знаходимо за таблицею значень функції Лапласа.

Цю ймовірність легко обчислити, якщо скористатись функцією **НОРМРАСП**, використовуючи різницю виразів **НОРМРАСП**(50;30;10;1) і **НОРМРАСП**(10;30;10;1), що дорівнює 0,9545. Результат застосування функції **НОРМРАСП** та графіки функції $f(x)$ і $F(x)$ наведено на рис. 4.8.




Рис.4.8. Обчислення за допомогою **НОРМРАСП**

Для інтервалу $(a - 3\sigma, a + 3\sigma) = (0, 60)$ шукана ймовірність обчислюється аналогічно за допомогою різниці виразів **НОРМРАСП**(60;30;10;1), **НОРМРАСП**(0;30;10;1) і дорівнює 0,9973, що співпадає також з результатами, одержаними за формулою (4.3).

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

Завдання 1.

1.1. Задана функція розподілу неперервної випадкової величини X .
 Знайти коефіцієнт A ; записати щільність розподілу $f(x)$; обчислити числові характеристики $M(X), D(X)$, а також $P(\alpha \leq X \leq \beta)$. Зробити креслення графіків функції розподілу та щільності розподілу.

$$1. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ Ax^5, & 0 < x \leq 3, \quad \alpha = 0,25; \beta = 0,75. \\ 1, & x > 3; \end{cases}$$

$$2. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ A\left(2x - \frac{x^2}{3}\right), & 0 < x \leq 3, \quad \alpha = 1; \beta = 2. \\ 1, & x > 3; \end{cases}$$

$$3. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ A(-x^2 + 4x), & 0 < x \leq 2, \quad \alpha = 0,5; \beta = 1,5. \\ 1, & x > 2; \end{cases}$$

$$4. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ Ax^2, & 0 < x \leq 1, \quad \alpha = 0,3; \beta = 0,8. \\ 1, & x > 1; \end{cases}$$

$$5. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ Ax^3, & 0 < x \leq 2, \quad \alpha = 0,2; \beta = 1,7. \\ 1, & x > 2; \end{cases}$$

$$6. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{6}, \\ A \cos 3x, & \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}, \quad \alpha = \frac{\pi}{6}, \quad \beta = \frac{\pi}{4}. \\ 1, & x > \frac{\pi}{3}; \end{cases}$$

$$7. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ Ax^2, & 0 < x \leq 2, \quad \alpha = 1,3; \beta = 1,5. \\ 1, & x > 2; \end{cases}$$

$$8. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ Ax^3, & 0 < x \leq 3, \quad \alpha = 0,25; \beta = 0,75. \\ 1, & x > 3; \end{cases}$$

$$9. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ A \sin x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{6}; \quad \alpha = \frac{\pi}{12}, \quad \beta = \frac{\pi}{6}. \\ 1, & x > \frac{\pi}{6}; \end{cases}$$

$$10. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ Ax^2, & 0 < x \leq 3, \quad \alpha = 0; \beta = 2. \\ 1, & x > 3; \end{cases}$$

1.2. Неперервна випадкова величина задана щільністю розподілу $y = f(x)$. Записати інтегральну функцію розподілу $y = F(x)$; обчислити числові характеристики $M(X), D(X)$, а також $P(\alpha \leq X \leq \beta)$. Зробити креслення графіків диференціальної та інтегральної функцій розподілу.

$$1. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, x > \frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}; \end{cases} \quad \alpha = -\frac{\pi}{4}; \beta = \frac{\pi}{4}.$$

$$2. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, x > \frac{\pi}{2}, \\ \sin x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}; \end{cases} \quad \alpha = -\pi; \beta = \frac{\pi}{4}.$$

$$3. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{6}, x > \frac{\pi}{3}, \\ 3 \sin 3x, & \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}; \end{cases} \quad \alpha = 0; \beta = \frac{\pi}{4}.$$

$$4. f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \cos^2 x, & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{2}; \end{cases} \quad \alpha = 0; \beta = \frac{\pi}{4}.$$

$$5. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1, \\ x - \frac{1}{2}, & 1 < x \leq 2, \alpha = 1; \beta = 1,5. \\ 0, & x > 2; \end{cases}$$

$$6. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \sin 2x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \alpha = 0; \beta = \frac{\pi}{4}. \\ 0, & x > \frac{\pi}{2}; \end{cases}$$

$$7. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2\cos x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{6}, \alpha = 0; \beta = \frac{\pi}{12}. \\ 0, & x > \frac{\pi}{6}; \end{cases}$$

$$8. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 3x^2, & 0 < x \leq 1, \alpha = 0; \beta = \frac{1}{2}. \\ 0, & x > 1; \end{cases}$$

$$9. f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{2}(2x-1), & 0 < x \leq 2; \alpha = \frac{1}{2}; \beta = 2. \\ 0, & x > 2. \end{cases}$$

$$10. f(x) = \begin{cases} ae^{-ax} (a > 0), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0; \end{cases}, \quad \alpha = 1; \beta = 2.$$

Завдання 1. У завданнях 1.1 та 1.2 номер варіанту вибирати за номером у списку до 11, починаючи з 11, 12, ... і т.д. варіанту – повторення завдань: 1, 2, ...,

Завдання 2. Випадкова величина X розподілена рівномірно на інтервалі $(a;b)$. Записати диференційну $f(x)$ та інтегральну $F(x)$ функції, знайти $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, якщо

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1) $a = 1, b = 6;$ | 2) $a = 2, b = 8;$ | 3) $a = 3, b = 8;$ |
| 4) $a = 3, b = 6;$ | 5) $a = 3, b = 7;$ | 6) $a = 4, b = 10;$ |

- 7) $a = -1, b = 4$; 8) $a = 2, b = 9$; 9) $a = 2, b = 7$;
 10) $a = 3, b = 9$; 11) $a = 3, b = 10$; 12) $a = -2, b = 4$;
 13) $a = 2, b = 12$; 14) $a = 12, b = 16$; 15) $a = 5, b = 10$;
 16) $a = 7, b = 11$; 17) $a = 1, b = 3$; 18) $a = 10, b = 14$;
 19) $a = 11, b = 19$; 20) $a = -10, b = -2$.

Зauważення. У завданнях 2, 3 та 4 номер варіанту вибирати за номером у списку.

Завдання 3. Час t безперервної роботи електроприладу має показниковий розподіл. Знайти ймовірність його безвідмовної роботи протягом N годин, якщо середній час його роботи – T годин, записавши відповідну диференціальну функцію розподілу.

- 1) $N = 200, T = 100$; 2) $N = 250, T = 100$;
 3) $N = 300, T = 200$; 4) $N = 300, T = 150$;
 5) $N = 300, T = 290$; 6) $N = 200, T = 180$;
 7) $N = 400, T = 200$; 8) $N = 400, T = 250$;
 9) $N = 400, T = 300$; 10) $N = 400, T = 380$;
 11) $N = 400, T = 350$; 12) $N = 500, T = 300$;
 13) $N = 500, T = 400$; 14) $N = 500, T = 450$;
 15) $N = 500, T = 150$; 16) $N = 600, T = 350$;
 17) $N = 600, T = 500$; 18) $N = 700, T = 400$;
 19) $N = 800, T = 650$; 20) $N = 800, T = 700$.

Завдання 4. Неперервна випадкова величина X має розподіл $N(a; \sigma)$.

Записати диференціальну функцію розподілу $f(x)$, побудувати її графік та графік інтегральної функції розподілу, знайти $P(\alpha < X < \beta)$, використовуючи функцію пакету Excel **НОРМРАСП**, якщо

- 1) $a = 3, \sigma = 4, \alpha = 0,5, \beta = 9$; 2) $a = 3, \sigma = 4, \alpha = 2, \beta = 9$;
 3) $a = 0, \sigma = 12, \alpha = 3, \beta = 6$; 4) $a = 2, \sigma = 8, \alpha = 5, \beta = 9$;
 5) $a = 2, \sigma = 1, \alpha = 4, \beta = 11$; 6) $a = 5, \sigma = 1, \alpha = 1, \beta = 5$;

- 7) $a=4$, $\sigma=2$, $\alpha=2$, $\beta=6$;
- 8) $a=1$, $\sigma=25$, $\alpha=1$, $\beta=3$;
- 9) $a=2$, $\sigma=25$, $\alpha=3$, $\beta=8$;
- 10) $a=3$, $\sigma=9$, $\alpha=0,25$, $\beta=10$;
- 11) $a=-1$, $\sigma=-1$, $\alpha=0$, $\beta=9$;
- 12) $a=-1$, $\sigma=5$, $\alpha=2$, $\beta=7$;
- 13) $a=-2$, $\sigma=9$, $\alpha=0$, $\beta=7$;
- 14) $a=-2$, $\sigma=4$, $\alpha=1$, $\beta=5,25$;
- 15) $a=12$, $\sigma=4$, $\alpha=5$, $\beta=9$;
- 16) $a=13$, $\sigma=4$, $\alpha=6$, $\beta=9$;
- 17) $a=11$, $\sigma=6$, $\alpha=6$, $\beta=12$;
- 18) $a=11$, $\sigma=6$, $\alpha=5$, $\beta=8$;
- 19) $a=-1$, $\sigma=4$, $\alpha=7$, $\beta=9,25$;
- 20) $a=1$, $\sigma=4$, $\alpha=0$, $\beta=14$.

Зauważення. Вибирати числові дані для побудови функцій розподілу, щоб побачити їх вигляд, як на рис. 4.2, 4.3 або, відповідно, на рисунках 4.6, 4.7.

Теоретичні запитання до теми

1. Які основні характеристики для неперервних випадкових величин?
2. Записати формули обчислення числових характеристик неперервних випадкових величин.
3. Записати основні закони розподілу неперервних випадкових величин, отримати для них інтегральну функцію розподілу.
4. Пояснити використання функції надійності на практиці.
5. Як використовують функцією пакету Excel **НОРМРАСП**?

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображаються формули теоретичної частини, розв'язання завдань самостійної роботи та отримані результати (студент здає електронний варіант проведених обчислень практичних задач).

При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівняти отримані результати проведених обчислень, знати відповіді на теоретичні запитання.

Додаткове завдання – обчислення числових характеристик одного (на вибір) закону розподілу неперервної випадкової величини.

Лабораторна робота № 5

Вибірка, її характеристики. Точкові оцінки числових характеристик випадкових величин. Побудова надійних інтервалів

Мета роботи: навчитися розраховувати точкові оцінки числових характеристик, будувати надійні інтервали для математичного сподівання у випадку відомої та невідомої дисперсії, використовуючи теоретичні знання та можливості застосування табличного процесора Microsoft Excel.

Теоретичні відомості

Вибірка, її характеристики

Дані у статистиці, отримані за допомогою спеціальних досліджень або із звичайних робочих записів у бізнесі, надходять до дослідника у вигляді неорганізованої маси, незалежно від того, чи є вони даними із вибіркової сукупності, чи даними з генеральної сукупності. Тому постає питання обробки і впорядкування даних.

Значення x_i вибірки називають **варіантами**. Послідовність варіант, розміщених в порядку зростання, називають **варіаційним рядом**. Якщо при цьому x_i повторюється n_i разів ($i = 1, 2, \dots, k$, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$), то число n_i називають **абсолютною частотою** варіанти x_i , а $\frac{n_i}{n}$ – **відносною частотою** варіанти x_i .

Статистичним розподілом вибірки називають перелік варіант та відповідних частот або відносних частот. Статистичний закон розподілу зручно задавати таблицею, що встановлює зв'язок між значеннями випадкової величини та їх частотами:

x_i	x_1	x_2	\dots	x_k
-------	-------	-------	---------	-------

n_i	n_1	n_2	\dots	n_k
-------	-------	-------	---------	-------

Означення. *Емпірична функція розподілу* має такий вигляд

$$F_n^*(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1; \\ \sum_{k=1}^n \frac{n_k}{n}, & x_k \leq x < x_{k+1} \ (k = 1, 2, \dots, n-1); \\ 1, & x \geq x_n. \end{cases} \quad (5.1)$$

Означення. *Полігоном частот* вибірки називають ламану з вершинами в точках $(x_i, n_i), (i = 1, 2, \dots, k)$. *Полігоном відносних частот* вибірки називають ламану з вершинами в точках $(x_i, \frac{n_i}{n}), (i = 1, 2, \dots, k)$.

Якщо X – неперервна випадкова величина, то її статистичний розподіл також подають у вигляді таблиць. Для оцінки $f(x)$ за вибіркою x_1, x_2, \dots, x_n розбивають інтервал на частинні інтервали довжини h , в таблицю записують середину i -того інтервалу, n_i – кількість елементів вибірки i -того інтервалу.

Прямокутники з основами h і висотами $\frac{n_i}{nh}$ у прямокутній системі координат утворюють фігуру, яку називають *гістограмою* вибірки.

Незміщеною сильно слушною оцінкою математичного сподівання випадкової величини X є *вибіркове середнє* $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ і реалізацію цієї оцінки позначають

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (5.2)$$

Вибіркове середнє для дискретного статистичного ряду обчислюють за формулою

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i, \text{ де } \sum_{i=1}^k n_i = n.$$

Вибіркове середнє для інтервального статистичного ряду обчислюють за формулою

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i z_i, \text{ де } z_i - \text{середина } i\text{-того інтервалу, } \sum_{i=1}^k n_i = n.$$

Оцінкою дисперсії σ^2 випадкової величини X є **вибіркова дисперсія**

$$\bar{s}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad (5.3)$$

яка є **зміщеною** оцінкою для σ^2 .

Величина

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, s^2 = \frac{n}{n-1} \bar{s}^2 \quad (5.4)$$

є **незміщеною** оцінкою дисперсії σ^2 випадкової величини X .

Якщо математичне сподівання a відоме, то **незміщеною сильно слушною оцінкою дисперсії** σ^2 випадкової величини X є оцінка

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - a)^2.$$

Вибіркову дисперсію для дискретного статистичного ряду обчислюють за формулою

$$\bar{s}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (n_i x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - \bar{x}^2, \quad (5.5)$$

відповідно

$$s^2 = \frac{n}{n-1} \bar{s}^2; s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (n_i x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - \bar{x}^2. \quad (5.6)$$

Вибіркову дисперсію для інтервального статистичного ряду обчислюють за формулою

$$\bar{s}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (n_i z_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i z_i^2 - \bar{x}^2, \quad (5.5')$$

відповідно

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (n_i z_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k n_i z_i^2 - \bar{x}^2. \quad (5.6')$$

Величина $\bar{s} = \sqrt{s^2}$ називається **вибірковим середнім квадратичним відхиленням**, $s = \sqrt{s^2}$ – **вибірковим виправленим середнім квадратичним відхиленням** (s^2 – вибіркова виправлена дисперсія).

Означення. **Медіаною** M_e називають варіанту, яка ділить варіаційний ряд на дві частини, рівні за кількістю варіант.

Для дискретних статистичних рядів

$$M_e = \begin{cases} x_m, & n = 2m - 1 \\ \frac{x_m + x_{m+1}}{2}, & \text{при } n = 2m. \end{cases} \quad (5.7)$$

Для інтервальних статистичних рядів

$$M_e = x_i + h_i \frac{\frac{n}{2} - \sum_{j=1}^i n_j}{n_i}, \quad (5.7')$$

де x_i – початок медіанного інтервалу (йому відповідає перша з нагромаджених частот, що перевищує половину всіх спостережень), h_i – довжина i -го інтервалу, n_i – частота медіанного інтервалу.

Означення. **Модою** називають варіанту, яка найчастіше трапляється у вибірці.

Для дискретних статистичних рядів

$$M_0 = x_j, \text{ якщо } n_j = \max_i n_i. \quad (5.8)$$

Для інтервальних статистичних рядів

$$M_0 = x_i + h \frac{n_i - n_{i-1}}{2n_i - n_{i-1} - n_{i+1}}, \quad (5.8')$$

де x_i – початок інтервалу із найбільшою частотою, n_i – частота i -го інтервалу.

Означення. *Початковим емпіричним моментом порядку k* називається вираз

$$M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, \quad (5.9)$$

зокрема $M_1 = \bar{x}$.

Означення. *Центральним емпіричним моментом порядку k* називається вираз

$$m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k, \quad (5.10)$$

зокрема, $m_2 = \bar{s}^2$.

Означення. *Коефіцієнтом асиметрії A_s* називається відношення центрального емпіричного моменту третього порядку до куба середнього квадратичного відхилення:

$$A_s = \frac{m_3}{\sigma^3} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{s^3}. \quad (5.11)$$

Означення. *Ексцесом E* називається зменшене на три одиниці відношення центрального моменту четвертого порядку до четвертого степеня середнього квадратичного відхилення:

$$E = \frac{m_4}{\sigma^4} - 3. \quad (5.12)$$

Інтервальні оцінки параметрів розподілу

Означення. *Інтервальною оцінкою* параметрів розподілу генеральної сукупності називають оцінку, яка визначається двома числами – кінцями інтервалу.

Нехай X_1, X_2, \dots, X_n – вибірка з генеральної сукупності, θ – невідомий параметр генеральної сукупності X . При інтервальному оцінюванні невідомого

параметра θ шукають такі дві функції $h_1 = h_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ і $h_2 = h_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$, для яких завжди $h_1 < h_2$ і при заданому $\gamma \in (0, 1)$ виконується умова

$$P(h_1 < \theta < h_2) \geq \gamma. \quad (5.13)$$

Тоді інтервал (h_1, h_2) називають **надійним інтервалом**, γ -рівнем надійності, а числа h_1 і h_2 – *нижньою та верхньою межами надійності*.

Рівень надійності задається наперед і найчастіше беруть 0,95; 0,99.

Побудова надійних інтервалів

Для знаходження надійного інтервалу математичного сподівання у випадку **відомої дисперсії** виконаємо наступні дії:

- a) розрахуємо за допомогою дисперсійної таблиці значення математичного сподівання \bar{x} за формулою $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$;
- б) установимо надійну ймовірність або рівень надійності (рівень значущості);
- в) за таблицею нормального закону розподілу запишемо надійний інтервал: $\left(\bar{x} - \varepsilon_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \varepsilon_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ або $x \pm \varepsilon_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Побудований надійний інтервал

$$\left(\bar{x} - \frac{t\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t\sigma}{\sqrt{n}} \right), \quad (5.14)$$

де $t = \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}$, містить в собі невідомий параметр a (математичне сподівання) з ймовірністю γ . Число t при заданому значенні γ знаходимо із таблиці значень функції Лапласа.

Висновки:

- 1) при збільшенні обсягу n вибірки число $\varepsilon = \frac{\sigma t}{\sqrt{n}}$ зменшується, тобто

точність оцінки підвищується;

2) зростання надійності $\gamma = 2\Phi(t)$ веде до збільшення t , отже, до зростання ε , або до зниження точності.

Для побудови надійного інтервалу математичного сподівання у випадку *невідомої дисперсії* виконаємо наступні дії:

а) розрахуємо точкові оцінки основних характеристик випадкових величин за допомогою дисперсійної таблиці за формулами (5.2), (5.6);

б) задамо γ – надійну ймовірність або рівень значущості;

в) для ймовірності γ та $(n-1)$ степенів вільності за таблицею розподілу Стьюдента знайдемо $t_{\gamma, n-1}$. Перший стовпчик таблиці відповідає кількості степенів вільності $(n-1)$, перший рядок – ймовірності γ . На перетині $(n-1)$ рядка та γ стовпчика знаходимо шукане значення $t_{\gamma, n-1}$;

г) запишемо надійний інтервал

$$\bar{x} \mp t_{\gamma, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}}.$$

Зauważення. У статистиці кількістю степенів вільності певної величини називають різницю між кількістю випробувань і кількістю величин, обчислених завдяки цим випробуванням.

Визначення числових характеристик і надійних інтервалів з використанням табличного процесору Microsoft Excel

Більшість числових характеристик у випадку незгрупованих даних можна обчислити з використанням табличного процесору Microsoft Excel. Основні вбудовані функції Excel, що застосовуються для таких розрахунків, надано у таблиці 5.1. Щоб викликати потрібну функцію, слід натискати кнопку f_x у командному рядку, обрати категорію *Статистические* та ім'я функції.

Крім того, часто корисні такі функції:

- **НАИБОЛЬШИЙ** (массив, k) – надає k -е найбільше значення в ряді даних;

- **НАЙМЕНЬШИЙ** (массив, k) – надає k -е найменше значення в ряді даних.

Ширину надійного інтервалу для генерального середнього можна знайти за допомогою вбудованої статистичної функції Excel **ДОВЕРИТ** (*альфа, stand_откл, размер*). Параметр *альфа* – це так званий рівень значущості, $\alpha = 1 - \gamma$; параметр *stand_откл* – це вибікове середнє квадратичне відхилення S ; параметр *размер* – це обсяг вибірки.

Таблиця 5.1

Статистичні функції Excel

Числові характеристики	Назва функції
Середнє	СРЗНАЧ (число1, число2, ...)
Середнє геометричне	СРГЕОМ (число1, число2, ...)
Мода	МОДА (число1, число2, ...)
Медіана	МЕДІАНА (число1, число2, ...)
Дисперсія	ДИСП (число1, число2, ...) ДИСПР (число1, число2, ...)
Середнє квадратичне відхилення	СТАНДОТКЛОН (число1, число2, ...)
Мінімальне значення	МИН (число1, число2, ...))
Максимальне значення	МАКС (число1, число2, ...))
Частота	ЧАСТОТА (массив_даних; массив_інтервалов)

Побудова гістограми засобами Microsoft Excel

Excel надає два способи побудови гістограми.

Для побудови гістограми *першим способом* необхідно:

1) Внести в лист Excel вхідні дані та інтервали, за якими ці дані будуть групуватися.

2) Знайти частоти попадання даних в інтервали за допомогою функції **ЧАСТОТА**, для чого:

- виділити діапазон комірок (на одну більше, ніж інтервалів), в яких будуть записані частоти;

- викликати f_x – Статистические – **ЧАСТОТА**;

- ввести посилання на комірки, що містять вхідні дані і інтервали;
 - натиснути Ctrl+Shift+Enter.
- 3) Викликати *Вставка — Гистограмма*, з'явиться діалогове вікно (див. рис. 5.1).




Рис. 5.1. Діалогове вікно майстра гістограм

- 4) Надати необхідні для побудови гістограми параметри:
- діапазон вхідних даних, спосіб їх групування (за рядками або стовпчиками) та імена рядів даних, якщо це потрібно;
 - якщо імена рядів надано, відмітити *Добавить легенду* і вказати її розміщення;
 - якщо потрібно, добавити *Имена рядов*, або (та) *Имена категорий*, або (та) *Значенія*;
 - якщо потрібно, добавити *Заголовок*, *Линии сетки*, *Оси*, *Таблицу данных*.
- Для побудови гістограми другим способом необхідно:
- 1) Внести в лист Excel вихідні дані.

2) Обрати в меню *Сервис – Анализ данных – Гистограмма*, появиться діалогове вікно (див. рис. 5.2).




Рис.5.2. Діалогове вікно для побудови гістограми

3) Задати необхідні для побудови гістограми параметри:

вхідний діапазон – задати посилання на комірки, в яких знаходяться вхідні дані;

інтервал карманов (параметр не є обов'язковим) – задати діапазон комірок і набір граничних значень у порядку зростання; якщо параметр не введений, то буде автоматично створений набір відрізків, рівномірно розподілених між мінімальним і максимальним значеннями даних;

вихідний діапазон – ввести посилання на верхню ліву комірку діапазону, в який буде надано гістограму, або відмітити параметр *Новий рабочий лист* або *Новая рабочая книга*;

інтегральний процент – якщо цей параметр відмічено, то будуть розраховані накопичені частоти і побудований їх графік;

вивод графика – якщо цей параметр відмічено, то буде створено автоматично діаграму, при цьому обов'язково задається значення *Новая книга*.

Приклад 1. Нехай $\sigma = 2$, $n = 25$, $\gamma = 0,95$. Знайти надійний інтервал для a , якщо $\bar{x} = 5$.

Розв'язання. Для знаходження t використаємо рівняння

$$2\Phi(t) = \gamma \Rightarrow 2\Phi(t) = 0,95 \Rightarrow \Phi(t) = 0,475.$$

Із таблиці значень функції Лапласа знаходимо $t = 1,96$.

Отже, $\varepsilon = \frac{2 \cdot 1,96}{\sqrt{25}} = 0,784$ і отримаємо інтервал $(\bar{x} - 0,784; \bar{x} + 0,784)$ або

$(4,216; 5,784)$.

Цей результат можна трактувати так: якщо зроблена достатньо велика кількість вибірок, то в 95% випадків значення a належить знайденому інтервалі, а в 5% це значення a може вийти за межі інтервалу.

Приклад 2. Нехай X – нормальну розподілену випадкова величина; яка має такі параметри: $n = 25$, $\bar{x} = 20$, $s = 0,4$. Знайти надійний інтервал для оцінки математичного сподівання, якщо $\gamma = 0,95$.

Розв'язання. Знаходимо t_γ з таблиці: $t(0,95; 24) = 2,064$. Тоді

$$t_\gamma \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,064 \cdot \frac{0,4}{5} \approx 0,165.$$

Отже, $(\bar{x} - 0,165; \bar{x} + 0,165)$ – надійний інтервал або $(19,835; 20,165)$.

Приклад 3. Дано вибірка $X=1, 0, -1, 0, 1, 0$. Знайти точкову оцінку математичного сподівання, а також зміщену і незміщену оцінки дисперсії та середньоквадратичного відхилення. Побудувати надійний інтервал із ймовірністю 95% при $\sigma = 1$ і надійний інтервал у випадку невідомої дисперсії із ймовірністю 95%. Порівняти побудовані надійні інтервали.

Розв'язування. Зведемо вихідні дані до дисперсійної таблиці та виконаємо відповідні обчислення (табл.5.2).

Таблиця 5.2. Дисперсійна таблиця до прикладу 3

n	x_i	x_i^2
1	1	1
2	0	0
3	-1	1
4	0	0
5	1	1
6	0	0
Σ	1	3

За даними, одержаними з табл.5.2, розрахуємо:

- математичне сподівання \bar{x} :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6};$$

- зміщену та незміщену оцінки дисперсії

$$\overline{\sigma_x^2} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) - \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \frac{1}{6} \cdot 3 - \frac{1}{6^2} \cdot 1^2 = \frac{17}{36};$$

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \frac{1}{5} \cdot 3 - \frac{1}{6 \cdot 5} \cdot 1^2 = \frac{17}{30};$$

- зміщену та незміщену оцінки середньоквадратичного відхилення

$$\overline{\sigma_x} = \sqrt{\overline{\sigma_x^2}} = \sqrt{\frac{17}{36}} = \frac{\sqrt{17}}{6};$$

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2} = \sqrt{\frac{17}{30}}.$$

Знайдемо надійний інтервал у випадку відомої дисперсії $\sigma=1$ з надійністю 95%, тобто $\gamma=0,95$. За таблицями нормального розподілу маємо число 1,96. Тоді надійний інтервал матиме вигляд

$$\left(\frac{1}{6} - 1,96 \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{6} + 1,96 \frac{1}{\sqrt{6}} \right); (-0,63; 0,97).$$

Знайдемо надійний інтервал для математичного сподівання у випадку невідомої дисперсії з надійністю 95%.

Для рівня зі значущістю 5% та п'ятьма степенями вільності за таблицю розподілу Стьюдента знаходимо $t_{\text{студ}}(0.95, 5)$. Перший стовпчик таблиці показує кількість степенів вільності, перший рядок – рівень надійності. На перетині знаходимо табличне значення $t_{\text{студ}}(0.95, 5)$. Тоді надійний інтервал матиме вигляд

$$\left(\frac{1}{6} - 2,57 \frac{0,566}{\sqrt{6-1}}, \frac{1}{6} + 2,57 \frac{0,566}{\sqrt{6-1}} \right); (-0,48; 0,82).$$

Приклад 4. За даними вибіркового дослідження відома заробітна платня (у грн.) 20-и службовців певної компанії (табл. 5.3). Знайти за допомогою вбудованих статистичних функцій Excel всі можливі числові характеристики за

даними таблиці. Знайти надійний інтервал для генерального середнього – середньої заробітної платні службовців компанії.

Таблиця 5.3

3560	2190	2390	3400
2180	2400	3350	2340
2900	2570	3300	3150
3680	3250	2250	3240
2180	2600	2870	3050

Розв'язання. Запишемо в лист Excel вхідні дані і числові характеристики, які можна знайти (рис. 5.3). Для знаходження характеристик введемо:

- 1) середнє значення (математичне сподівання) – формула **СРЗНАЧ(A2:D6);**
- 2) медіана – формула **МЕДИАНА(A2:D6);**
- 3) дисперсія (незміщена оцінка) – формула **ДИСП(A2:D6);**
- 4) середнє квадратичне відхилення (незміщена оцінка) – формула **СТАНДОТКЛОН(A2:D6);** також можна ввести **КОРЕНЬ(H4),** тобто обчислення за означенням (за коміркою дисперсії);
- 5) максимальне значення – формула **МАКС(A2:D6);**
- 6) мінімальне значення – формула **МИН(A2:D6).**

Зauważення. Функція **ДИСП** оцінює дисперсію за вибіркою, тобто вважається, що аргументи є вибіркою із генеральної сукупності. Якщо дані представляють всю генеральну сукупність, то слід використовувати функцію **ДИСПР.**

Для знаходження надійного інтервалу для генерального середнього знайдемо за допомогою функції **ДОВЕРИТ** його ширину (див. рис. 5.4, командний рядок). Параметрами візьмемо $\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,95 = 0,05$; замість другого параметру надамо посилання на комірку, що містить розраховане значення середнього квадратичного відхилення; *размер* – це обсяг вибірки, що дорівнює 20.

Для знаходження початку інтервалу запишемо в комірку H9 формулу «=H3-H8»; для знаходження кінця – формулу «=H3+H8» в комірку H10.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	3560	2190	2390	3400	Середнє			2842,5	
3	2180	2400	3350	2340	Медіана			2885	
4	2900	2570	3300	3150	Дисперсія			257914,5	
5	3680	3250	2250	3240	Сер. Кв. відхилення			507,8528	
6	2180	2600	2870	3050	Макс. Знач.			3680	
7					Мін. Знач.			2180	
8					Ширина над. інтервалу			222,5722	
9					Поч. над. інт.			2662,428	
10					Кінець над. інт.			3107,572	
11									

Рис. 5.3. Розрахунок числових характеристик

Приклад 5. За даними вибіркового дослідження відома кількість родин з дітьми дошкільного віку в селах деякої області (табл. 5.4). Побудувати за допомогою Excel гістограму за даними таблиці.

Таблиця 5.4

27	36	34	46	43	28	29	37	40	43
40	33	50	37	41	32	27	43	34	32
30	41	54	42	47	35	49	49	54	36
36	51	36	24	35	25	33	38	38	36
29	51	32	36	53	30	55	44	46	38
29	44	48	30	34	46	47	36	37	36
30	58	42	46	46	29	38	44	40	30
35	35	63	47	37	29	53	41	42	41

Розв'язання. Запишемо в лист Excel вхідні дані завдання (рис. 5.5). Розрахуємо частоти попадання в інтервали (див. зміст командного рядка на рис. 5.5).




Рис. 5.4. Вхідні дані для побудови гістограми

Викличемо *Вставка – Гистограмма*, задамо діапазон даних.

Для зручності читання діаграми добавимо *Заголовок та Значення*.

Приберемо відмітку *Легенда*, оскільки імена рядів не було надано – розглядається тільки один тип даних.

Після побудови діаграми можна у разі необхідності змінити шрифти, ширину стовпчиків гістограми, їх колір та фон. Для внесення змін потрібно двічі натиснути правою кнопкою миші на відповідне поле гістограми.

Зауважимо, що на горизонтальній осі надаються не граници інтервалів, а їх порядковий номер.




Рис. 5.5. Лист Excel з гістограмою

Приклад 6. Обчислити вибіркове середнє та дисперсію, медіану та моду для вибірки

інтервал	[2,4)	[4,6)	[6,8)	[8,10)	[10,12)
n_i	2	8	35	40	15

та побудувати емпіричну функцію розподілу.

Розв'язання. Обсяг вибірки $n = 2 + 8 + 35 + 40 + 15 = 100$. Тоді

z_i	3	5	7	9	11
n_i	2	8	35	40	15

Обчислюємо числові характеристики:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i z_i = \frac{1}{100} (2 \cdot 3 + 8 \cdot 5 + 35 \cdot 7 + 40 \cdot 9 + 15 \cdot 11) = 8,16;$$

$$\begin{aligned} \bar{s}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i z_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{1}{100} (2 \cdot 9 + 8 \cdot 25 + 35 \cdot 49 + 40 \cdot 81 + 15 \cdot 121) - 8,16^2 = \\ &= 69,88 - 66,5856 = 3,2944; \end{aligned}$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1} \bar{s}^2 = \frac{100}{99} \cdot 3,29 = 3,33;$$

$$M_e = 8 + 2 \frac{50 - 45}{40} = 8,25; \quad M_0 = 8 + 2 \frac{40 - 35}{80 - 35 - 15} = 8,33.$$

При побудові емпіричної функції розподілу (кумуляти) для інтервального статистичного розподілу вибірки за основу береться припущення, що ознака на кожному частинному інтервалі має рівномірну щільність імовірностей. Тому кумулята матиме вигляд ламаної лінії, яка зростає на кожному частковому інтервалі та наближається до 1. Отже, емпірична функція розподілу

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2, \\ 0,02, & 2 < x \leq 4, \\ 0,1, & 4 < x \leq 6, \\ 0,45, & 6 < x \leq 8, \\ 0,85, & 8 < x \leq 10, \\ 1, & 10 < x \leq 12, \end{cases} .$$

Графік кумуляти показано на рис.5.6.




Рис.5. 6. Вигляд емпіричної функції розподілу

Зauważення. З рисунка також визначається модальний інтервал (інтервал, що має найбільшу частоту появи), який дорівнює 8–10. Цей інтервал також є і медіанним, оскільки $F^*(8) < 0,5$, але $F^*(10) > 0,5$, то, беручи до уваги неперервність досліджуваної ознаки та властивість функції $F^*(x)$, яка є неспадною функцією, всередині інтервалу існує таке значення $X = M_e$, для якого $F^*(M_e) = 0,5$.

Відповідь. $\bar{x} = 8,16; s^2 = 3,33; M_e = 8,25; M_0 = 8,33$.

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

1. Користуючись теоретичними знаннями та засобами програмного забезпечення Excel, розв'язати завдання 4 (додаток 1).

2. За даною вибіркою X знайти точкову оцінку математичного сподівання, а також зміщену і незміщену оцінки дисперсії та середньоквадратичного відхилення. Побудувати надійний інтервал із ймовірністю 95%, тобто $\gamma = 0,95$ для вказаного σ і надійний інтервал у випадку невідомої дисперсії для рівня із значущістю 5%. Порівняти побудовані надійні інтервали.

$$2.1. \quad X = (-2, -1, -2, 0, 1, 0, 2, 2, 4, 1), \sigma = 4.$$

$$2.2. \quad X = (-2, 1, 2, 0, 3, 4, 2, 5, 0, 1), \sigma = 1.$$

$$2.3. \quad X = (2, -1, 0, -3, 0, 2, 1, 4, 0, 1), \sigma = 1.$$

$$2.4. \quad X = (4, 2, 0, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1), \sigma = 2.$$

$$2.5. \quad X = (2, -1, 2, 0, 3, 0, -2, -2, 0, -1), \sigma = 1.$$

$$2.6. \quad X = (2, -1, 2, 0, 3, 0, -2, -2, 4, -1), \sigma = 1.$$

$$2.7. \quad X = (-2, 1, -2, 0, -3, 2, -2, 4, 0, 1), \sigma = 2.$$

$$2.8. \quad X = (3, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 3, 0, 1), \sigma = 2.$$

$$2.9. \quad X = (2, -1, -1, 0, 0, -2, 2, -4, 0, 1), \sigma = 1.$$

$$2.10. \quad X = (2,1,4,0,4,0,2,4,0,1), \sigma = 2.$$

$$2.11. \quad X = (3,1,3,3,0,2,2,3,0,1), \sigma = 2.$$

$$2.12. \quad X = (4,1,4,0,3,4,-2,4,-2,1), \sigma = 2.$$

$$2.13. \quad X = (-1,1,-1,0,-1,0,2,1,0,1), \sigma = 1.$$

$$2.14. \quad X = (1,1,0,1,0,2,2,1,0,1), \sigma = 1.$$

$$2.15. \quad X = (2,1,2,3,3,3,2,4,4,1), \sigma = 2.$$

$$2.16. \quad X = (-2,-1,-2,0,0,-2,2,-2,0,1), \sigma = 1.$$

$$2.17. \quad X = (2,-1,2,0,2,0,2,-1,0,-1), \sigma = 1.$$

$$2.18. \quad X = (2,1,2,4,0,4,4,4,0,1), \sigma = 2.$$

$$2.19. \quad X = (-2,-3,-2,0,-3,0,2,3,3), \sigma = 1.$$

$$2.20. \quad X = (1,1,1,0,2,0,2,2,0,1), \sigma = 1.$$

3. Розв'язати наступні задачі за номером варіанта.

Номе р варіанту	Номери завдань	Номе р варіанту	Номери завдань
1	3.1, 3.2	6	3.10, 3.2
2	3.4, 3.3	7	3.1, 3.5
3	3.6, 3.5	8	3.4, 3.7
4	3.9, 3.7	9	3.6, 3.3
5	3.10, 3.8	10	3.9, 3.8

3.1. Відомі дані про безаварійну роботу автоматизованого поліграфічного комплексу (в місяцях) (табл. 5.5). Побудувати статистичний ряд за даними вибірки, визначити середній час безаварійної роботи, дисперсію і середнє квадратичне відхилення часу. Побудувати полігон частот і гістограму.

Таблиця 5.5

0,000	0,000	0,002	0,006	0,023	0,084	0,382	0,810	0,003	0,864
1,033	0,912	0,093	0,324	0,194	0,522	2,336	0,057	0,654	0,250
0,877	0,276	0,037	0,537	0,183	1,306	0,752	0,198	1,623	0,875
0,185	0,274	0,613	0,356	0,645	0,676	1,079	0,500	0,902	0,191
0,250	0,348	0,320	0,182	0,458	0,936	1,204	0,576	0,303	0,522

3.2. Інтервал між потягами у метро складає 3 хв. В таблиці 5.6 надано час очікування пасажирами потягу. Скласти інтервальний статистичний ряд, знайти середній час очікування, медіану, дисперсію і середнє квадратичне відхилення часу. Побудувати функцію розподілу величини X – часу очікування.

Таблиця 5.6

0,787	1,004	0,941	0,612	1,200	1,692	1,354	0,908	1,245	1,292
0,617	0,828	1,413	1,030	1,459	2,483	2,769	1,563	2,661	1,635
1,654	0,838	1,143	0,618	2,317	1,853	1,555	0,653	1,922	1,653
1,747	2,677	0,341	2,952	0,545	1,297	1,981	0,214	2,452	2,087
0,001	0,007	0,025	0,312	1,068	2,604	0,014	0,045	2,340	2,001

3.3. Відомі дані про інтервал часу між появою покупців у касовому залі деякого магазину (табл.5.7). Побудувати інтервальний статистичний ряд, знайти всі можливі числові характеристики. Побудувати графік функції розподілу випадкової величини X – інтервалу часу.

Таблиця 5.7

0,002	1,004	0,007	0,612	0,091	1,692	1,527	0,908	2,590	1,292
4,134	3,647	0,374	2,150	0,778	5,223	3,344	2,001	3,492	4,011
3,507	0,838	0,148	0,618	0,704	1,853	3,007	0,653	3,600	1,653
0,738	1,069	2,453	1,447	2,614	3,742	4,314	1,211	1,949	5,001
1,000	0,007	1,272	0,312	1,832	2,604	2,267	0,045	4,450	2,001

3.4. В таблиці 5.8 наведено значення прибутку 50 фірм, що належать одній корпорації (в 1000 у. од.). Знайти середнє значення прибутку, дисперсію і середнє квадратичне відхилення. Побудувати полігон частот і гістограму.

Таблиця 5.8

4,744	9,127	7,201	8,650	11,534	9,013	10,390	9,268	7,354	10,255
6,232	6,739	6,088	8,671	15,103	9,124	11,902	10,216	10,954	11,470
7,351	9,832	7,126	9,715	10,744	10,687	10,582	12,271	11,047	13,190

5,536	8,917	9,823	8,383	14,212	15,031	13,001	11,089	12,091	10,321
9,766	5,854	2,917	6,379	6,748	7,024	11,587	11,101	10,954	10,387

3.5. Відомі дані про місячний обсяг виробництва (тис. книг) підприємств поліграфічного виробництва (табл. 5.9). Побудувати інтервальний статистичний ряд, полігон частот і гістограму. Знайти всі можливі числові характеристики. Побудувати графіки функції розподілу.

Таблиця 5.9

11,240	18,545	17,750	22,560	18,355	20,424	20,650	10,780	15,590
13,720	28,505	23,170	20,360	22,450	21,590	14,565	24,295	25,140
27,655	17,786	27,045	28,650	18,670	31,445	18,540	15,598	19,720
15,230	21,240	19,535	12,934	18,195	19,074	17,037	19,610	20,970
22,075	15,090	20,754	10,195	13,580	21,490	13,987	22,645	21,218

3.6. В таблиці 5.10 наведено середні значення прибутку (в грн.) опитаних 50 сімей в поточному році. Знайти середнє значення всього прибутку, дисперсію і середнє квадратичне відхилення. Побудувати полігон частот і гістограму.

Таблиця 5.10

4844	9327	7210	8650	11540	9010	10390	9260	7350	10255
6530	6730	6088	10610	15100	9524	11900	10210	10954	11570
7350	9832	7120	9715	10745	10680	10580	12270	11047	13290
5546	8947	9923	8383	14252	15031	13011	11289	12090	10325
9760	5855	2920	6400	6748	7824	11980	11100	10954	10380

3.7. Відомі дані про інтервал часу між телефонними повідомленнями в залі телефонної станції (табл.5.11). Побудувати інтервальний статистичний ряд, знайти всі можливі числові характеристики. Побудувати графік функції розподілу випадкової величини X – інтервалу часу.

Таблиця 5.11

0,0025	1,0042	0,0072	0,6121	0,0912	1,6922	1,5274	0,9081	2,5991	1,2925
4,1342	3,6471	0,3742	2,1504	0,7789	5,2239	3,3447	2,0016	3,4927	4,0116
3,5078	0,8389	0,1486	0,6184	0,7041	1,8535	3,2271	0,6531	3,6564	1,6536
1,7382	1,0694	0,4536	1,4479	1,6146	2,7421	1,3141	1,2112	1,9492	1,0014

3.8. Наведено результати дослідження річного обсягу споживання риби та рибної продукції в кг на душу населення (табл.5.12). Побудувати інтервальний статистичний ряд, знайти всі можливі числові характеристики. Побудувати графік функції розподілу.

Таблиця 5.12

14	10,5	9,8	12,5	11,5	13,5	12,4	10,4	11	12
10,2	11,5	9,8	13,6	12,5	9,5	10,2	11,9	11,4	12,8
11,6	12,3	10,8	9,9	11,1	10,7	11,4	10,9	12,9	11,1
13,8	14	13,1	10,7	12,9	13,9	10,1	12,2	11,2	13,1

3.9. В таблиці 5.13 наведено середні значення ваги 50 шоколадок (в грамах), яка визначалась на експериментальній лінії запуску. Знайти середнє значення всього прибутку, дисперсію і середнє квадратичне відхилення. Побудувати полігон частот і гістограму.

Таблиця 5.13

100,01	101,02	100,32	100,25	101,60	99,98	99,79	100,04	97,99	102,55
100,30	99,73	99,88	100,10	101,00	97,24	100,90	102,10	99,54	101,70
99,50	98,32	100,20	97,15	100,45	101,80	101,80	102,70	100,47	99,90
99,46	99,47	99,23	93,83	102,52	100,31	100,11	100,89	100,90	98,25
97,69	98,55	99,20	99,90	97,48	100,24	100,80	101,00	100,54	99,89

3.10. Відомі дані про можливості збою проявлення пластиини в автоматичному проявному процесорі (в секундах) (табл. 5.14). Побудувати статистичний ряд за даними вибірки, визначити середній час безаварійної роботи, дисперсію і середнє квадратичне відхилення часу. Побудувати полігон

частот і гістограму.

Таблиця 5.14

0,00	0,00	0,02	0,06	0,23	0,08	0,32	0,80	0,00	0,84
1,04	0,91	0,03	0,34	0,94	0,52	2,36	0,57	0,65	0,50
0,67	0,76	0,03	0,57	0,83	1,30	0,72	0,98	1,62	0,85
0,85	0,74	0,61	0,56	0,45	0,67	1,09	0,00	0,90	0,91
0,25	0,48	0,32	0,82	0,58	0,93	1,24	0,76	0,30	0,22

Теоретичні запитання до теми

1. Пояснити відмінність між статистичним рядом вибірки та інтервальним статистичним рядом.
2. Записати основні числові характеристики вибірки, пояснити їх обчислення за допомогою вбудованих статистичних функцій Excel.
3. Пояснити побудову надійного інтервалу математичного сподівання у випадку відомої та невідомої дисперсії.
4. Зміщена та незміщена оцінка дисперсії, формули обчислення.
5. Пояснити побудову гістограм.

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображаються формули теоретичної частини, розв'язання завдань самостійної роботи та отримані результати (студент здає електронний варіант проведених обчислень практичних задач).

При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівняти отримані результати проведених обчислень, також знати відповіді на теоретичні запитання.

Додаткові завдання

1. При формуванні портфелю поставок для фірми було обрано 100 поставщиків, які працювали із фірмою у минулому році. Знайти надійний

інтервал для долі поставщиків, що несвоєчасно здійснюють поставки на рівні надійності 0,999, якщо у вибірці таких 45.

Таблиця 5.10

11,240	18,545	17,750	22,560	18,355	20,424	20,650	10,780	15,590
13,720	28,505	23,170	20,360	22,450	21,590	14,565	24,295	25,140
27,655	17,786	27,045	28,650	18,670	31,445	18,540	15,598	19,720
15,230	21,240	19,535	12,934	18,195	19,074	17,037	19,610	20,970
22,075	15,090	20,754	10,195	13,580	21,490	13,987	22,645	21,218

2. Відомі дані про розмір вкладів в банку (табл. 5.11). Знайти з надійністю 0,96 надійний інтервал для середнього розміру вкладу.

Таблиця 5.11

Розмір вкладу (тис. грн.)	10-30	31-50	51-70	71-90	91-110	111-130
Кількість вкладчиків	1	3	10	30	60	7

Лабораторна робота № 6

Обчислення коефіцієнта кореляції та перевірка його статистичної значущості. Побудова ліній регресії

Мета роботи – навчитися обчислювати і визначати статистичну значущість кореляції, обчислювати та аналізувати множинні та частинні коефіцієнти кореляції, використовуючи теоретичні знання та можливості табличного процесора Microsoft Excel; будувати ліній регресії та аналізувати їх взаємне розміщення.

Теоретичні відомості

Поняття кореляційного зв'язку між досліджуваними величинами

В багатьох прикладних задачах необхідно виявити залежність між двома властивостями (ознаками) X і Y одного і того ж економічного об'єкту, або між певними ознаками різних об'єктів. Якщо вказані ознаки допускають кількісне вимірювання, і, з погляду економічної теорії, виходячи з економічної характеристики об'єкту, ознака Y залежить від ознаки X , тоді X можна назвати незалежною змінною, або факторною ознакою, або просто фактором, а Y – залежною змінною або результативною ознакою.

Якщо кожному значенню факторної ознаки X відповідає одне і тільки одне значення результативної ознаки Y , то говорять, що між цими ознаками існує функціональний зв'язок: $Y = f(X)$.

Якщо кожному значенню факторної ознаки X відповідає безліч значень результативної ознаки Y , то між цими ознаками існує статистичний зв'язок.

Вивчення статистичного зв'язку дуже складний і трудомісткий процес, у якому потрібно аналізувати багатомірні таблиці даних. Тому зазвичай вивчається не статистичний, а кореляційний зв'язок між X та Y .

Якщо кожному значенню факторної ознаки X відповідає певне середнє значення результативної ознаки Y , то між цими ознаками існує кореляційний зв'язок, тобто кореляційною є функціональна залежність між значеннями X і середніми значеннями Y : $\bar{Y} = f(X)$.

Наприклад, відомо, що з однакових за площею ділянок землі при рівних кількостях внесеного добриву отримують різний урожай. Тому, якщо Y – урожайність зерна, а X – кількість внесеного добрива, то функціонального зв'язку між X та Y немає. Це пояснюється впливом таких випадкових факторів, як температура повітря, кількість опадів і т. ін. Однак досвід показує, що середній урожай є функцією від кількості добрива, тобто між X та Y існує кореляційний зв'язок.

Основними задачами кореляційного аналізу є:

- вивчення сили зв'язку між двома і більше ознаками досліджуваного об'єкту;
- встановлення факторів, що найбільш суттєво впливають на результативну ознаку;
- виявлення невідомих причинно-наслідкових зв'язків між ознаками об'єкту.

Групування даних для кореляційного аналізу

Вибіркові дані для вивчення кореляційного зв'язку між ознаками X та Y мають вигляд пар їх значень: $(x_1; y_1)$, $(x_2; y_2)$, ..., $(x_n; y_n)$, x_i – значення величини X , y_i – значення Y , n – кількість пар значень, $i = \overline{1, n}$.

Якщо кількість пар значень достатньо велика (принаймні, $n > 20$), то для зручності розрахунків дані групуються.

Для групування даних необхідно:

1) Розбити множини значень X та Y на інтервали, їх кількість для X та Y може бути різною (позначення: k – кількість інтервалів для X ; m – кількість інтервалів для Y).

2) Зобразити дані графічно: побудувати на площині точки з координатами $(x_i; y_j)$. В результаті отримується площа, розбита на прямокутники, в кожному з яких може бути множина точок (рис. 6.1). Вказане графічне зображення вибіркових даних називається полем кореляції.




Рис. 6.1. Поле кореляції

3) Побудувати кореляційну таблицю (табл. 6.1). В першому рядку, розбитому на дві частини, записуються інтервали $[a_i; a_{i+1})$ для X та їх середини x_i . У першому стовпчику, розбитому на дві частини, записуються інтервали $[b_j; b_{j+1})$ для Y та їх середини y_j . В центральній частині таблиці записуються частоти n_{ij} – кількість точок, що потрапили в прямокутник, обмежений по осі X інтервалом $[a_i; a_{i+1})$ і по осі Y інтервалом $[b_j; b_{j+1})$. В останньому рядку таблиці записуються частоти n_i для X – кількість точок, що потрапили в прямокутники, які відповідають інтервалу $[a_i; a_{i+1})$, тобто $n_i = \sum_{j=1}^m n_{ij}$ – сума частот n_{ij} в стовпчики з номером i . В останньому стовпчику таблиці записуються частоти n_j для Y – кількість точок, що потрапили в прямокутники, які відповідають інтервалу $[b_j; b_{j+1})$, тобто $n_j = \sum_{i=1}^k n_{ij}$ – сума частот n_{ij} в рядку з номером j .

Кореляційну таблицю можна розглядати як своєрідний подвійний статистичний ряд.

Таблиця 6.1

X (інтервали і їх середини)	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$...	$[a_k; a_{k+1})$	$n_j = \sum_{i=1}^k n_{ij}$	
Y (інтервали і їх середини)	x_1	x_2	...	x_k		
$[b_1; b_2)$	y_1	n_{11}	n_{21}	...	n_{k1}	n_1
$[b_2; b_3)$	y_2	n_{12}	n_{22}	...	n_{k2}	n_2
...
$[b_m; b_{m+1})$	y_m	n_{1m}	n_{2m}	...	n_{km}	n_m
$n_i = \sum_{j=1}^m n_{ij}$		n_1	n_2	...	n_k	

4) За даними кореляційної таблиці будується ряд, що відображає залежність середнього значення Y від X (табл. 6.2). В першому рядку таблиці записуються середини інтервалів x_i , в другому – відповідні середні значення \bar{y}_{x_i} , що знаходяться за формулами: $\bar{y}_{x_1} = \frac{y_1 n_{11} + y_2 n_{12} + \dots + y_m n_{1m}}{n_1}$; $\bar{y}_{x_2} = \frac{y_1 n_{21} + y_2 n_{22} + \dots + y_m n_{2m}}{n_2}$; ... $\bar{y}_{x_k} = \frac{y_1 n_{k1} + y_2 n_{k2} + \dots + y_m n_{km}}{n_k}$.

Таблиця 6.2

x_i	x_1	x_2	...	x_k
\bar{y}_{x_i}	\bar{y}_{x_1}	\bar{y}_{x_2}	...	\bar{y}_{x_k}
n_i	n_1	n_2	...	n_k

В результаті отримується статистичний ряд, що містить значення X , відповідні середні значення Y та частоти. За даними такого ряду проводиться кореляційний аналіз.

Коефіцієнт кореляції Пірсона

Для оцінки тісноти (або сили) зв'язку між X та Y слугує коефіцієнт кореляції. У випадку, коли між X та Y існує лінійний зв'язок та вибіркові дані

розподілені за нормальним законом, використовується коефіцієнт кореляції Пірсона, який звється ще *параметричним коефіцієнтом кореляції*.

Коефіцієнт кореляції Пірсона розраховується за формулою:

$$r = \frac{\bar{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_x \cdot s_y}, \quad (6.1)$$

де \bar{x} – вибіркове середнє величини X ;

\bar{y} – вибіркове середнє величини Y ;

\bar{xy} – вибіркове середнє величини XY ;

s_x – вибіркове середнє квадратичне відхилення величини X ;

s_y – вибіркове середнє квадратичне відхилення величини Y .

Враховуючи формулі для знаходження вибіркових середніх і середніх квадратичних відхилень, а саме:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i; & \bar{y} &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_j n_j; & \bar{xy} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m x_i y_j n_{ij}; \\ s_x &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^2 n_i - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i \right)^2}; & s_y &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_j^2 n_j - \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_j n_j \right)^2}; \end{aligned}$$

отримують більш зручну для розрахунків формулу:

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m x_i y_j n_{ij} - \left(\sum_{i=1}^k x_i n_i \right) \left(\sum_{j=1}^m y_j n_j \right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^k x_i^2 n_i - \left(\sum_{i=1}^k x_i n_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{j=1}^m y_j^2 n_j - \left(\sum_{j=1}^m y_j n_j \right)^2}}. \quad (6.2)$$

У випадку незгрупованих даних розрахункова формула суттєво спрощується:

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}}. \quad (6.3)$$

Властивості коефіцієнта кореляції Пірсона

- 1) Коефіцієнт кореляції Пірсона приймає значення на проміжку $[-1; 1]$, тобто $-1 \leq r \leq 1$.
- 2) Якщо $|r| \leq 0,5$, то зв'язок вважається слабким; якщо $0,5 < |r| \leq 0,7$, то зв'язок вважається середнім; $|r| > 0,7$, то зв'язок вважається сильним.
- 3) Якщо $r > 0$, то зв'язок називається додатнім, тобто зі збільшенням значень X значення Y також збільшуються. Якщо $r < 0$, то зв'язок називається від'ємним, тобто зі збільшенням значень X значення Y зменшуються.

Зauważення. Слід пам'ятати, що коефіцієнт кореляції Пірсона показує силу лінійного зв'язку. Якщо між X та Y існує сильний нелінійний зв'язок, коефіцієнт кореляції Пірсона може дорівнювати нулю.

Оскільки сила зв'язку між X та Y оцінюється за вибірковими даними, то необхідна перевірка її статистичної значущості, тобто оцінка можливості розповсюдити отримані результати на всю генеральну сукупність.

Перевірка статистичної значущості коефіцієнта кореляції Пірсона здійснюється за допомогою так званої t -статистики, яка розраховується за формулою

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}. \quad (6.4)$$

Розраховане значення t -статистики порівнюється з критичним значенням $t_{kрит}$. $t_{kрит}$ – табличне значення розподілу Стьюдента (додаток 4, таблиця 4), яке також можна знайти за допомогою вбудованої статистичної функції Excel **СТЬЮДРАСПОБР** ($\alpha; l$), де α – обраний дослідником рівень значущості, l – степені вільності, $l = n - 2$.

Якщо розраховане значення t -статистики більше критичного $|t| > t_{kрит}$, то коефіцієнт кореляції вважається значимим на обраному рівні α .

Приклад 1. За наявними даними про рівень механізації праці X (%) і продуктивності праці Y (од. продукції/год.) для 14 однотипних підприємств (табл. 6.3) оцінити тісноту зв'язку між X і Y . Визначити можливість розповсюдження результатів розрахунків на всі підприємства такого типу.

Таблиця 6.3

X	32	30	36	40	41	47	56	54	60	55	61	67	69	76
Y	20	24	28	30	31	33	34	37	38	40	41	43	45	48

Розв'язання. Дані таблиці 6.3 є вибіркою значень X і відповідних значень Y . Оскільки кількість даних невелика ($n=14$), то їх можна не групувати. Для оцінки тісноти зв'язку між X і Y розрахуємо коефіцієнт кореляції Пірсона за формулою (6.3.) для незгрупованих даних. Розрахунки для зручності оформимо у вигляді таблиці (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
32	20	1024	400	640
30	24	900	576	720
36	28	1296	784	1008
40	30	1600	900	1200
41	31	1681	961	1271
47	33	2209	1089	1551
56	34	3136	1156	1904
54	37	2916	1369	1998
60	38	3600	1444	2280
55	40	3025	1600	2200
61	41	3721	1681	2501
67	43	4489	1849	2881
69	45	4791	2025	3105
76	48	5779	2304	3848
Суми				
724	492	40134	18138	26907

Отже,

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j \right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{j=1}^n y_j^2 - \left(\sum_{j=1}^n y_j \right)^2}} = \frac{14 \cdot 26907 - 724 \cdot 492}{\sqrt{14 \cdot 40134 - 724^2} \sqrt{14 \cdot 18138 - 492^2}} =$$

$$= \frac{20490}{\sqrt{37700} \sqrt{11868}} \approx 0,969.$$

Таке ж значення отримується за допомогою вбудованої функції **КОРРЕЛ**(массив1, массив2) (рис. 6.2, 6.3).




Рис. 6.2. Структура вбудованої функції **КОРРЕЛ**

D3					f_x	=КОРРЕЛ(A2:A15;B2:B15)
	A	B	C	D	E	
1	X	Y				
2		32	20	коєфіцієнт кореляції		
3		30	24		0,968685	
4		36	28			
5		40	30			
6		41	31			
7		47	33			
8		56	34			
9		54	37			
10		60	38			
11		55	40			
12		61	41			
13		67	43			
14		69	45			
15		76	48			

Рис. 6.3. Обчислення коєфіцієнту кореляції

За значенням коефіцієнта кореляції можна зробити висновок, що між X і Y існує сильний додатній зв'язок.

Перевіримо статистичну значущість знайденого коефіцієнта кореляції Пірсона. Розрахуємо t-статистику за формулою (6.4):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0,969\sqrt{14-2}}{\sqrt{1-0,969^2}} \approx 13,59.$$

Знайдемо $t_{крит}$, враховуючи, що $l=n-2=14-2=12$. Оберемо рівень значущості $\alpha=0,01$. Тоді $t_{крит}=\text{СТЬЮДРАСПОБР}(0,01; 12)=3,055$.

Оскільки розраховане значення t-статистики більше критичного $13,59 > 3,055$, то коефіцієнт кореляції можна вважати значимим на обраному рівні $\alpha=0,01$.

Висновок. Між рівнем механізації праці та її продуктивністю на підприємствах, що досліджувалися, існує сильний додатній зв'язок: чим більше рівень механізації праці, тим вище її продуктивність. Висновок дійсний для всіх підприємств такого типу.

Множинний та частинний коефіцієнти кореляції

У випадку, коли досліджуваний об'єкт або явище характеризується більш ніж двома ознаками X_1, X_2, \dots, X_k , необхідно вивчати множинні залежності. Для оцінки сили зв'язку між певною ознакою X_i та усіма іншими ознаками слугує **множинний коефіцієнт кореляції**, який позначається R_i .

Для розрахунку множинного коефіцієнта кореляції необхідно:

1) Побудувати матрицю парних коефіцієнтів кореляції $r_{ij}, i=\overline{1,k}$ між ознаками X_i та X_j :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ r_{21} & 1 & \dots & r_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{k1} & r_{k2} & \dots & r_{kk} \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

2) Знайти визначник $|A|$ матриці A та алгебраїчне додовнення A_{ii} елемента r_{ii} цієї матриці.

3) Розрахувати множинний коефіцієнт кореляції за формулою:

$$R_i = \sqrt{1 - \frac{|A|}{A_{ii}}}. \quad (6.6)$$

Перевірка статистичної значущості множинного коефіцієнта кореляції здійснюється за допомогою t-статистики, яка розраховується за формулою:

$$t = \frac{R^2(n-k)}{(1-R^2)(k-1)}, \quad (6.7)$$

де n – кількість взаємопов'язаних значень ознак $X_i, i = \overline{1, k}$.

Розраховане значення t-статистики порівнюється з критичним значенням $F_{крит}$. $F_{крит}$ – табличне значення розподілу Фішера (додаток 4, таблиця 5), яке також можна знайти за допомогою вбудованої статистичної функції Excel **ФРАСПОБР** ($\alpha; l_1; l_2$), де α – обраний дослідником рівень значущості, l_1 ; l_2 – степені вільності, $l_1 = k - 1$; $l_2 = n - k$.

Якщо розраховане значення t-статистики більше критичного $|t| > F_{крит}$, то множинний коефіцієнт кореляції вважається значимим на обраному рівні значущості α .

У випадку, коли необхідно дослідити кореляційний зв'язок між ознаками X_i та X_j , $i = \overline{1, k}$, $j = \overline{1, k}$, із множини ознак X_1, X_2, \dots, X_k досліджуваного об'єкту або явища, вільний від впливу всіх інших ознак, розраховується **частинний коефіцієнт кореляції**, який позначається R_{ij} .

Для розрахунку частинного коефіцієнта кореляції необхідно:

- 1)** Побудувати матрицю парних коефіцієнтів кореляції A .
- 2)** Знайти алгебраїчні додовнення A_{ii}, A_{jj}, A_{ij} елементів r_{ii}, r_{jj}, r_{ij} відповідно.

3) Розрахувати частинний коефіцієнт кореляції за формулою:

$$R_{ij} = \frac{-A_{ij}}{\sqrt{A_{ii}A_{jj}}}. \quad (6.8)$$

Перевірка статистичної значущості частинного коефіцієнта кореляції здійснюється за допомогою t-статистики, яка розраховується за формулою:

$$t = \frac{R_{ij}\sqrt{n-k+2}}{\sqrt{1-R_{ij}^2}}, \quad (6.9)$$

де n – кількість взаємопов'язаних значень ознак $X_i, i = \overline{1, k}$.

Розраховане значення t-статистики порівнюється з критичним значенням $t_{крит}$. $t_{крит}$ – табличне значення розподілу Стьюдента, яке також можна знайти за допомогою вбудованої статистичної функції Excel **СТЬЮДРАСПОБР** ($\alpha; l$), де α – обраний дослідником рівень значущості, l – степені вільності, $l = n - k + 2$.

Якщо розраховане значення t-статистики більше критичного $|t| > t_{крит}$, то частинний коефіцієнт кореляції вважається значимим на обраному рівні значущості α .

Зauważення. 1. Вважається, що для коректного використання множинного і частинного коефіцієнтів кореляції необхідно, щоб вибіркові дані мали сумісний нормальний розподіл, однак перевірка цієї умови на практиці зазвичай не виконується, оскільки пов'язана зі значними труднощами у розрахунках.

2. Замість парного коефіцієнта кореляції Пірсона можна використовувати також парний коефіцієнт кореляції Спірмена.

3. Кореляційна матриця завжди симетрична відносно головної діагоналі, оскільки $r_{ij} = r_{ji}, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, k}$. Елементи головної діагоналі завжди дорівнюють 1, оскільки вони є коефіцієнтами кореляції X_i та X_i .

Приклад 2. Для вивчення залежності урожайності зернових культур Z (ц/га) від якості пашні X (бали) і кількості внесеного добрива Y (кг/га) було проведено дослідження 6 фермерських хазяйств, результати якого надано у

таблиці 6.5. Визначити силу зв'язку між Z та X та Y , використовуючи множинний коефіцієнт кореляції. Порівняти силу зв'язку між Z та X та між Z та Y за частинними коефіцієнтами кореляції.

Таблиця 6.5

X	26	35	36	40	41	45
Y	2,1	2,3	2,4	2,6	2,9	3
Z	18	21	22,1	25,3	28	28,5

Розв'язання. За умов задачі необхідно для об'єкту, що характеризується трьома ознаками X , Y та Z ($k = 3$), розрахувати множинний коефіцієнт кореляції R_Z і частинні коефіцієнти кореляції R_{XZ} та R_{YZ} на основі 6 взаємопов'язаних трійок вибіркових даних (x_i, y_i, z_i) , $i = \overline{1, n}$, $n = 6$.

Побудуємо матрицю парних коефіцієнтів кореляції, які обчислимо за формулою (6.3). Розрахунки для зручності оформимо у вигляді таблиці (табл. 6.6).

Таблиця 6.6

Розрахункова таблиця							Суми
x_i	26	35	36	40	41	45	223
y_i	2,1	2,3	2,4	2,6	2,9	3	15,3
z_i	18	21	22,1	25,3	28	28,5	142,9
x_i^2	676	1225	1296	1600	1681	2025	8503
y_i^2	4,41	5,29	5,76	6,76	8,41	9	39,63
z_i^2	324	441	488,41	640,09	784	812,25	3489,75
$x_i y_i$	54,6	80,5	86,4	104	118,9	135	579,4
$x_i z_i$	468	735	795,6	1012	1148	1282,5	5441,1
$y_i z_i$	37,8	48,3	53,04	65,78	81,2	85,5	371

Отже, за формулою (6.3) маємо:

$$r_{XY} = r_{YX} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}} = \frac{6 \cdot 579,4 - 223 \cdot 15,3}{\sqrt{6 \cdot 8503 - 223^2} \sqrt{6 \cdot 39,63 - 15,3^2}} \approx 0,935;$$

$$r_{XZ} = r_{ZX} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i z_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n z_i \right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n z_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n z_i \right)^2}} = \frac{6 \cdot 5441,1 - 223 \cdot 142,9}{\sqrt{6 \cdot 8503 - 223^2} \sqrt{6 \cdot 3489,75 - 142,9^2}} \approx 0,954;$$

$$r_{YZ} = r_{ZY} = \frac{n \sum_{i=1}^n y_i z_i - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) \left(\sum_{i=1}^n z_i \right)}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n z_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n z_i \right)^2}} = \frac{6 \cdot 371,62 - 15,3 \cdot 142,9}{\sqrt{6 \cdot 39,63 - 15,3^2} \sqrt{6 \cdot 3489,75 - 142,9^2}} \approx 0,991;$$

Таким чином, кореляційна матриця має вигляд:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0,935 & 0,954 \\ 0,935 & 1 & 0,991 \\ 0,954 & 0,991 & 1 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо визначник $|A|$ матриці A та алгебраїчне доповнення $A_{zz} = A_{33}$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0,935 & 0,954 \\ 0,935 & 1 & 0,991 \\ 0,954 & 0,991 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2 \cdot 0,935 \cdot 0,991 \cdot 0,954 - 0,954^2 - 0,991^2 -$$

$$- 0,935^2 \approx 0,0015;$$

$$A_{zz} = A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0,935 \\ 0,935 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0,935^2 \approx 0,1258;$$

$$\text{тоді } R_z = R_3 = \sqrt{1 - \frac{|A|}{A_{33}}} = \sqrt{1 - \frac{0,0015}{0,1258}} \approx 0,994. \quad \text{Значення множинного}$$

коєфіцієнта кореляції R_z показує, що величина Z сильно пов'язана з X та Y .

Зauważення. Можна значно спростити розрахунки, використовуючи вбудовану математичну функцію **МОПРЕД**, яка дозволяє знайти визначник

заданої матриці (рис. 6.4), а також задавати формули для обчислення множинного коефіцієнта кореляції.

	A	B	C	D
1				
2	1	0,935	0,954	
3	0,935	1	0,991	
4	0,954	0,991	1	
5	Визначник		0,001502	
6				

Рис. 6.4. Обчислення визначника матриці

Перевіримо статистичну значущість множинного коефіцієнта кореляції R_Z . Знайдемо t-статистику за формулою (6.7):

$$t = \frac{R^2(n-k)}{(1-R^2)(k-1)} = \frac{0,994^2(6-3)}{(1-0,994^2)(3-1)} \approx 124,09.$$

Знайдемо $F_{крит}$, враховуючи, що $l_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$, $l_2 = n - k = 6 - 3 = 3$.

Оберемо рівень значущості $\alpha = 0,01$. Тоді $F_{крит} = \text{ФРАСПОБР}(0,01; 2; 3) = 30,82$. Оскільки $t > F_{крит}$, то множинний коефіцієнт кореляції R_Z є статистично значимим на рівні значущості $\alpha = 0,01$.

Для обчислення частинних коефіцієнтів кореляції $R_{XZ} = R_{13}$ та $R_{YZ} = R_{23}$ знайдемо алгебраїчні доповнення:

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0,935 & 1 \\ 0,954 & 0,991 \end{vmatrix} = 0,935 \cdot 0,991 - 0,954 \approx -0,027;$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 0,935 \\ 0,954 & 0,991 \end{vmatrix} = (-1)(0,991 - 0,935 \cdot 0,954) \approx -0,099;$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 0,991 \\ 0,991 & 1 \end{vmatrix} = (1 - 0,991^2) \approx 0,018;$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 0,954 \\ 0,954 & 1 \end{vmatrix} = (1 - 0,954^2) \approx 0,09.$$

Тоді за формулою (6.9) маємо:

$$R_{13} = \frac{-A_{13}}{\sqrt{A_{11}A_{33}}} = \frac{-(-0,027)}{\sqrt{0,018 \cdot 0,126}} \approx 0,577; \quad R_{23} = \frac{-A_{23}}{\sqrt{A_{22}A_{33}}} = \frac{-(-0,099)}{\sqrt{0,09 \cdot 0,126}} \approx 0,929.$$

Значення частинних коефіцієнтів кореляції показують, що величина Z пов'язана з величиною Y сильніше, ніж з величиною X .

Перевіримо статистичну значущість частинного коефіцієнта кореляції R_{13} . Зайдемо t-статистику за формулою (6.9):

$$t = \frac{R_{ij}\sqrt{n-k+2}}{\sqrt{1-R_{ij}^2}} = \frac{0,577\sqrt{6-3+2}}{\sqrt{1-0,577^2}} \approx 1,581.$$

Зайдемо критичне значення $t_{kрит}$, враховуючи, що $l=n-k+2=5$. Оберемо рівень значущості $\alpha=0,01$.

Тоді $t_{kрит}=\text{СТЬЮДРАСПОБР}(0,01;5)=4,032$ (рис. 6.4). Оскільки розраховане значення t-статистики менше критичного $|t| < t_{kрит}$, то частинний коефіцієнт кореляції R_{13} не є значимим на рівні значущості $\alpha=0,01$.




Рис. 6.5. Структура вбудованої функції Excel **СТЬЮДРАСПОБР**

Якщо $|t| > t_{kp}$, то вважають коефіцієнт кореляції значущим, якщо ж $|t| < t_{kp}$ – то незначущим.

Відповідно до рівня значущості розглядається часткова класифікація кореляційних зв'язків:

- 1) висока значима кореляція – для r , який відповідає рівню статистичної значущості $\alpha \leq 0,01$;

- 2) значима кореляція – для r , який відповідає рівню статистичної значущості $\alpha \leq 0,05$;
- 3) тенденція достовірного зв'язку – для r , який відповідає рівню статистичної значущості $\alpha \leq 0,1$;
- 4) незначима кореляція – при r , який не досягає рівня статистичної значущості.

Перевіримо статистичну значущість частинного коефіцієнта кореляції R_{23} . Знайдемо t-статистику:

$$t = \frac{R_{ij}\sqrt{n-k+2}}{\sqrt{1-R_{ij}^2}} = \frac{0,929\sqrt{6-3+2}}{\sqrt{1-0,929^2}} \approx 5,614.$$

Оскільки розраховане значення t-статистики більше критичного $|t| > t_{\text{крит}}$, то частинний коефіцієнт кореляції R_{23} є значимим на рівні значущості $\alpha = 0,01$.

Висновок. Урожайність зернових культур сильно пов'язана з якістю пашні і кількістю внесеного добриву. При цьому урожайність значно сильніше залежить від кількості добрива, ніж від якості пашні. Сила зв'язку між урожайністю та якістю пашні середня та не є статистично значимою.

Зauważення. Вбудовані сервісні функції Microsoft Excel дозволяють розраховувати коефіцієнти кореляції Пірсона.

Приклад і результати розрахунків парних коефіцієнтів кореляції надано на рис. 6.6.

Клітини матриці, що розташовані вище головної діагоналі звичайно надаються незаповненими, оскільки матриця симетрична відносно головної діагоналі.

Засобами Microsoft Excel неможливо розрахувати парні або множинні коефіцієнти кореляції, однак можна значно спростити розрахунки, використовуючи вбудовану математичну функцію **МОПРЕД**, яка дозволяє знайти визначник заданої матриці.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Кореляційний аналіз								
3	Вхідні дані								
4	Значення				Стовп. 1		Стовп. 2	Стовп. 3	
5	1	1	328	0,054	Рядок 1		1		
6	2	2	329	0,101	Рядок 2	0,8914		1	
7	3	3	329	0,099	Рядок 3	0,563423	0,692214		1
8	4	4	345	0,019					
9	5	5	352	0,065					
10	6	6	370	0,053					
11	7	7	377	0,178					
12	8	8	385	0,174					
13	9	9	396	0,289					
14	10	10	399	0,195					
15	11	11	390	0,102					
16	12	12	373	0,138					
17									

Рис. 6.6. Результати розрахунку коефіцієнтів кореляції

Побудова прямих регресії

Нехай X і Y – випадкові величини, зв’язок між якими треба вивчити. В результаті n випробувань отримали n точок $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

Вибіркові середні та дисперсії позначимо $\bar{x}, \bar{y}, \bar{s}_x^2, \bar{s}_y^2$. За оцінку коефіцієнта кореляції $\rho = \rho(X, Y)$ можна взяти

$$r = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\bar{s}_x \bar{s}_y} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{n \bar{s}_x \bar{s}_y} \quad (6.10)$$

за невеликої кількості випробувань.

Аналогічно визначаються рівняння вибіркових прямих регресії: *прямої регресії Y на X*

$$y - \bar{y} = r \frac{\bar{s}_y}{\bar{s}_x} (x - \bar{x}) \quad (6.11)$$

і *прямої регресії X на Y*

$$x - \bar{x} = r \frac{\bar{s}_x}{\bar{s}_y} (y - \bar{y}). \quad (6.12)$$

Прямі регресії доцільно шукати у тому випадку, коли точки (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) групуються навколо деякої прямої.

Якщо $y = \alpha_1 x + \alpha_0$ – рівняння вибіркової прямої регресії Y на X , то згідно з означенням повинно бути

$$\Phi(\alpha_1, \alpha_0) = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha_1 x_i - \alpha_0)^2 \rightarrow \min.$$

Диференціюючи по α_1 і α_0 функцію $\Phi(\alpha_1, \alpha_0)$ отримуємо систему рівнянь для знаходження α_1 і α_0 , з якої

$$\begin{cases} \alpha_0 = \bar{y} - \alpha_1 \bar{x}, \\ \alpha_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \end{cases}$$

Якщо значення x_i відомі без похибок, а значення y_i незалежні та точні, то оцінка дисперсії (похибка вимірювань) величин y_i визначаються за формулою

$$\sigma^2 = \frac{\Phi_{\min}}{n-2}, \text{ де } \Phi_{\min} = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha_1 x_i - \alpha_0)^2.$$

Оцінки дисперсій коефіцієнтів α_1 і α_0 визначаються за формулами

$$\sigma_{\alpha_0}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \cdot \frac{\Phi_{\min}}{n-2}, \quad \sigma_{\alpha_1}^2 = \frac{n}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \cdot \frac{\Phi_{\min}}{n-2}.$$

Якщо величини y_i мають нормальній розподіл, то для коефіцієнтів α_1 і α_0 справджаються такі надійні інтервали:

$$(\alpha_k - t(n-2, \gamma) \sigma_{\alpha_k}, \alpha_k + t(n-2, \gamma) \sigma_{\alpha_k}), k = 0, 1,$$

де α_k – оцінки, отримані методом найменших квадратів, а число $t(n-2, \gamma)$ знаходиться за таблицею Стьюдента при кількості степенів вільності $k = n-2$ і $\gamma = P(|t| < t(n-2, \gamma))$.

Приклад 3. Для торгових агентів компанії зареєстровані дві ознаки: X – витрати на представництво, Y – обсяг продажів товарів за певний час (в тис. грн). Дані наведені в таблиці 6.7

Таблиця 6.7

x_i	6,5	6,5	6,2	6,7	6,9	6,5	6,1	6,7
y_i	105	125	110	120	140	135	95	130

Знайти вибірковий коефіцієнт кореляції, рівняння прямої регресії Y на X , похибку вимірювань, надійні інтервали для коефіцієнтів прямої регресії при $\gamma = 0,95$.

Розв'язання. Усі результати обчислень заносимо в таблицю 6.8 ($n = 8$).

Таблиця 6.8

№	x_i	y_i	$x_i y_i$	x_i^2	y_i^2	\hat{y}_i	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	6,5	105	682,5	42,25	11025	119,4120	207,7057
2	6,5	125	812,5	42,25	15625	119,4120	31,2257
3	6,2	110	682,0	38,44	12100	105,2981	22,1079
4	6,7	120	804,0	44,89	14400	128,8212	77,8136
5	6,9	140	966,0	47,61	19600	138,2305	3,1311
6	6,5	135	877,5	42,25	18225	119,4110	242,9857
7	6,1	95	579,5	37,21	9025	100,5934	31,2861
8	6,7	130	871,0	44,89	16900	128,8212	1,3896
Σ	52,1	960	6275	339,79	116900		617,6454

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \cdot 52,1 = 6,5125; \quad \bar{y} = \frac{1}{8} \cdot 960 = 120;$$

$$\bar{s}_x^2 = \frac{1}{8} \cdot 339,79 - 6,5125^2 = 0,0611; \quad \bar{s}_x = 0,2472;$$

$$\bar{s}_y^2 = \frac{1}{8} \cdot 116900 - 120^2 = 212,5; \quad \bar{s}_y = 14,5774; 23$$

$$r = \frac{6275 - 8 \cdot 6,5125 \cdot 120}{8 \cdot 0,2472 \cdot 14,5774} = 0,7978.$$

Записуємо пряму регресії Y на X за формулою (6.11) $y - \bar{y} = r \frac{\bar{s}_y}{\bar{s}_x} (x - \bar{x})$, тому

$$\alpha_1 = r \frac{\bar{s}_y}{\bar{s}_x} = 0,7978 \cdot \frac{14,5774}{0,2472} = 47,0463;$$

$$\alpha_0 = \bar{y} - \alpha_1 \bar{x} = 120 - 47,0463 \cdot 6,5125 = -186,3890;$$

$$\hat{y} = 47,0463x - 186,3890.$$

Обчислимо:

$$\hat{y}_1 = 47,0463 \cdot 6,5 - 186,389 = 119,4120;$$

$$\hat{y}_2 = 47,0463 \cdot 6,5 - 186,389 = 119,4120;$$

$$\hat{y}_3 = 47,0463 \cdot 6,2 - 186,389 = 105,2981;$$

$$\hat{y}_4 = 47,0463 \cdot 6,7 - 186,389 = 128,8212;$$

$$\hat{y}_5 = 47,0463 \cdot 6,9 - 186,389 = 138,2305;$$

$$\hat{y}_6 = 47,0463 \cdot 6,5 - 186,389 = 119,4120;$$

$$\hat{y}_7 = 47,0463 \cdot 6,1 - 186,389 = 100,5934;$$

$$\hat{y}_8 = 47,0463 \cdot 6,7 - 186,389 = 128,8212.$$

$$\Phi_{\min} = 617,6454.$$

Знаходимо

$$\Delta = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = 8 \cdot 339,79 - 52,1^2 = 3,91.$$

$$\text{Тоді } \sigma^2 = \frac{617,6454}{8-2} = 102,94044;$$

$$\sigma_{\alpha_0}^2 = \frac{339,79}{3,91} \cdot 102,9409 = 8945,8537; \quad \sigma_{\alpha_0} = 94,5825;$$

$$\sigma_{\alpha_1}^2 = \frac{8}{3,91} \cdot 102,9409 = 210,6208; \quad \sigma_{\alpha_1} = 14,1278.$$

З таблиці розподілу Стьюдента знаходимо $t(6;0,95) = 2,45$. Аналогічно, за допомогою $t_{\text{крит}} = \text{СТЬЮДРАСПОБР}(0,05;6) = 2,4469$. Тоді з ймовірністю 0,95

$$-186,389 - 2,45 \cdot 94,5825 < \alpha_0 < -186,389 + 2,45 \cdot 94,5825,$$

тобто $-418,1161 < \alpha_0 < 45,3381$.

$$47,0463 - 2,45 \cdot 14,1278 < \alpha_1 < 47,0463 + 2,45 \cdot 14,1278,$$

тобто $12,4332 < \alpha_1 < 81,6594$.

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

1. Користуючись теоретичними знаннями та засобами програмного забезпечення Excel, розв'язати завдання 5 (додаток 1).

2. Розвязати наступні задачі:

– непарні варіанти: 2.1, 2.3;

– парні варіанти: 2.2, 2.4.

2.1. В таблиці 6.9 наведено дані про роздрібний товарообіг Z (млрд. грн.), середню кількість населення X (млн. осіб) та середній дохід Y (млн. грн.). Проаналізувати зв'язок між Z та X і Y за частинними і множинним коефіцієнтами кореляції.

Таблиця 6.9

Z	1,2	1,3	2,5	1,4	1,2	0,2	2,4	4,1	1,1
X	1,4	1,4	2,5	1,5	1,3	0,3	2,6	4,2	1,1
Y	1,3	1,3	1,4	1,8	1,5	1,6	1,8	1,9	1,6

2.2. В таблиці 6.10 приведені дані про щомісячний прибуток Z (тис. у. од.), витрати на рекламу X (тис. у. од.) та вкладення капіталу в цінні папери Y (тис. у. од.). Проаналізувати зв'язок між Z та X і Y за частинними і множинним коефіцієнтами кореляції.

Таблиця 6.10

Z	10	12	12	14	16	17	18
X	0,2	0,5	0,3	0,5	0,5	0,6	0,8
Y	0,8	0,2	1	1,2	0,9	1	1,1

2.3. Для дослідження впливу капіталовкладень X (млн. грн.) на отриманий річний прибуток Y (млн. грн.) було зібрано статистичні дані за 20 великими

підприємствами (табл. 6.11). Визначити силу зв'язку між означеними факторами.

Таблиця 6.11

X Y	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50
1,5 – 2,5	1	-	-	-	-
2,5 – 3,5	2	5	2	-	-
3,5 – 4,5	-	3	3	2	-
4,5 – 5,5	-	-	-	2	-

2.4. В таблиці 6.12 наведено дані про рівень витрат X (%) та річний дохід Y (млн. грн.), які було зібрано за 50 супермаркетами. Визначити силу зв'язку між означеними факторами.

Таблиця 6.12

X Y	4 – 6	6 – 8	8 – 10	10 – 12	12 – 14
0,5 – 2,0	-	-	2	3	1
2,0 – 3,5	-	4	5	1	-
3,5 – 5,0	-	8	5	5	-
5,0 – 6,5	3	8	2	-	-
6,5 – 8,0	2	1	-	-	-

3. За експериментальними даними вимірювань додатку 3, де ΔE – колірні відмінності виміряного кольору від еталонного значення, D – оптична густина фарби, 80, 40 – розтискування растрової точки ($80+k$, вказано k) при стабільній подачі фарби та зволожувального розчину та при коригуванні подачі фарби автоматизованою системою контролю параметрів відбитка визначити силу зв'язку між обраними факторами та порівняти їх.

Зauważення. Номер варіанта відповідає номеру ділянки, варіанти 1 та 2 є, відповідно, варіантами 11 та 12.

Теоретичні запитання до теми

- Пояснити побудову коефіцієнта кореляції Пірсона.
- Властивості коефіцієнта кореляції Пірсона, перевірка його статистичної значущості.

3. Побудова множинного та частинного коефіцієнтів кореляції.
4. Побудова прямих регресій.
5. Пояснити застосування функцій програмного забезпечення Excel для розв'язування практичних задач кореляційного аналізу.

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображаються формули теоретичної частини, хід роботи та отримані результати. При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівняти отримані результати проведених обчислень, а також знати відповіді на теоретичні запитання. Також студент здає електронний варіант проведених обчислень практичних задач.

Додаткове завдання

За даними таблиці 6.13 (опитування однієї з груп економічної спеціальності) проаналізувати зв'язок між вибраними означеніми факторами за частинними і множинним коефіцієнтами кореляції., побудувати ліній регресії.

Зauważення. За даними таблиці обчислення та вигляд ліній регресій для U , V (U – середня оцінка з вищої математики за два семестри в балах, V – оцінка з макроекономіки за семестр в балах) показано на рис. 6.7 та 6.8.

L	M	N	O
U	V		
84,41176	81,11765	середнє	
74,88235	74,48529	дисперсія	
8,653459	8,630486	кв. відхил.	
0,506451		кореляція	
0,507799	коефіцієн	0,505106	
41,19143		42,63689	
43,22034		38,48075	
$u=0,508v+43,22$		$v=0,505u+38,48$	

Rис.6.7. Обчислення всіх значень для ліній регресій




Рис. 6. 8. Вигляд ліній регресій

Таблиця 6.13

D	E	F	G	H	I	J
Дані студентів		Зріст X	Вага Y	ЗНО Z	Вишка U	макек V
1		165	52	176	70	80
2		165	64	175	97	97
3		175	76	186,5	85	62
4		172	54	171	90	80
5		168	49	176	80	90
6		165	46	173	88	90
7		158	49	175	80	80
8		180	90	180	68	70
9		165	43	176	97	80
10		194	90	177	85	80
11		166	55	174	80	80
12		169	50	170	78	70
13		154	43	192	90	80
14		158	45	192	90	90
15		170	57	189,5	97	90
16		160	47	176	80	80
17		168	52	185	80	80

Лабораторна робота №7

Перевірка законів розподілу випадкових величин: розподіл з рівномірною щільністю та розподіл Пуассона

Мета роботи: навчитись перевіряти гіпотези про закони розподілу величини X , використовуючи теоретичні знання та всі набуті навики обчислень за допомогою застосування табличного процесора Microsoft Excel.

Теоретичні відомості

На основі статистичних даних при розв'язуванні практичних задач необхідно зробити припущення про вигляд закону розподілу випадкової величини X . При цьому для остаточного вирішення питання про вигляд закону розподілу доцільно перевірити, наскільки зроблене припущення узгоджується з дослідними даними. Через обмежену кількість спостережень емпіричний закон розподілу, зазвичай, в деякій мірі, відрізняється від передбачуваного, навіть, якщо припущення про вигляд закону розподілу виявилося правильним. В зв'язку з цим виникає наступна задача: чи розбіжність між емпіричним і передбачуваним (теоретичним) законом розподілу є наслідком обмеженості числа спостережень, а чи вона є істотною і пов'язана з тим, що істинний закон розподілу випадкової величини суттєво відрізняється від передбачуваного. Для розв'язування цієї задачі служать так звані «критерії згоди».

«**Критерієм згоди**» називають критерій перевірки гіпотези про передбачуваний вигляд закону розподілу, наприклад, критерій згоди: Колмогорова, Пірсона (критерій χ^2), Романовського та інші.

Поняття про статистичні гіпотези

При застосуванні певних статистичних методів обробки даних вибірки часто ставляться вимоги до розподілу даних або до числових характеристик.

Означення. Статистичною гіпотезою називається будь-яке припущення про властивості досліджуваної величини, висунуте на основі статистичних даних.

За змістом статистичні гіпотези можна віднести до таких типів:

- 1) Гіпотези про вид закону розподілу досліджуваної величини.
- 2) Гіпотези про числові характеристики досліджуваної величини.
- 3) Гіпотези про рівність числових характеристик досліджуваних величин.
- 4) Гіпотези про належність досліджуваних величин до однієї генеральної сукупності.
- 5) Гіпотези про вид моделі, що описує взаємозв'язок між досліджуваними величинами.
- 6) Гіпотези про належність досліджуваних величин до одного класу.

Прийняття основної або однієї з альтернативних гіпотез здійснюється на основі дослідження статистичних даних. Дослідження проводиться за певним *критерієм*, який обирається відповідно до змісту гіпотези і виду наявних статистичних даних.

Якщо сформульовані гіпотези H_0 – основна та H_1 , як альтернативна (конкуруюча), і обраний критерій перевірки справедливості основної гіпотези, то прийняття H_0 означає відкидання H_1 , а відкидання H_0 означає справедливість H_1 .

Оскільки прийняття гіпотези здійснюється на основі статистичних даних, то завжди існує ймовірність помилки.

Означення. Ймовірність відкидання гіпотези H_0 , якщо вона справедлива, називається ймовірністю *помилки першого роду* або *рівнем значущості*, який позначається α . Величина $1 - \alpha$ є ймовірністю прийняття справедливої гіпотези і називається *рівнем надійності*.

Ймовірність прийняття гіпотези H_0 , якщо вона не вірна, називається ймовірністю *помилки другого роду* і позначається β . Величина $1 - \beta$ є ймовірністю відкидання невірної гіпотези і називається *потужністю*

критерію.

Чим менше рівень значущості, тим менше ймовірність відкинути вірну гіпотезу. Зазвичай рівень значущості обирається дослідником рівним 0,1; 0,05; 0,01 або 0,001. Якщо, наприклад, обраний рівень значущості $\alpha=0,01$, то ризик відкинути вірну гіпотезу виникає в одному випадку із ста.

Зauważення. Перевірка статистичної гіпотези не надає точного висновку щодо її вірності або невірності. *Прийняття гіпотези означає, що на прийнятому рівні значущості вона не протирічить статистичним даним.*

Перевірка статистичних гіпотез зазвичай здійснюється за такими етапами:

- 1) Висунення припущення про вид розподілу досліджуваної величини (величин) або про її числові характеристики.
- 2) Формулювання статистичних гіпотез.
- 3) Вибір критерію перевірки відповідно до змісту гіпотез і статистичних даних.
- 4) Вибір рівня значущості залежно від вимог до точності результатів дослідження.
- 5) Розрахунок значення обраного критерію за статистичними даними.
- 6) Порівняння розрахованого значення критерію з його критичним значенням і прийняття або відкидання основної гіпотези.

Перевірка гіпотези про вид закону розподілу досліджуваної величини

Перевірка гіпотези про вид закону розподілу досліджуваної величини має велике значення для прикладних досліджень. Необхідність такої перевірки виникає при виборі критерію, оскільки для багатьох з них висувається вимога нормального розподілу статистичних даних. Означені гіпотези перевіряються при проектуванні систем масового обслуговування, перевірки якості продукції або праці і т. ін.

Припустимо, що з деякої генеральної сукупності X , яка розглядається як випадкова величина, обрана вибірка $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. За даними вибірки

побудовано статистичний ряд (табл. 7.1), що містить варіанти x_i та відповідні частоти n_i , $i = \overline{1, k}$, k – кількість варіант у випадку дискретного ряду. У випадку інтервального ряду x_i – середини інтервалів, k – кількість інтервалів.

Таблиця 7.1

x_i	x_1	x_2	...	x_k
n_i	n_1	n_2	...	n_k

Отриманий на основі вибіркових даних статистичний ряд називається **емпіричним законом розподілу** величини X .

За даними статистичного ряду можна знайти числові характеристики, які є вибірковими параметрами закону розподілу X . Вид закону розподілу визначається відповідно до умов здобуття вибірки або залежно від виду графіка емпіричної щільності розподілу (гістограми) у випадку неперервної випадкової величини X і полігону частот, якщо величина X є дискретною. Параметри обраного закону розподілу заміняються відповідними вибірковими параметрами.

Означення. Закон розподілу випадкової величини X , параметрами якого є відповідні вибіркові числові характеристики, називається **теоретичним законом розподілу**.

При здійсненні такої заміни немає впевненості, що закон розподілу обраний правильно. Тому розроблено процедуру, яка дозволяє оцінити ступінь відповідності обраного закону даним вибірки. Критерій, в яких формулюється лише одна гіпотеза H_0 , і необхідно перевірити, чи узгоджуються статистичні дані з цією гіпотезою, чи ні, називають **критеріями згоди**. Найбільш відомим з яких є **критерій Пірсона** χ^2 (хі-квадрат).

Критерій Пірсона χ^2 обчислюється за формулою:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}, \quad (7.1)$$

де n'_i – частоти, отримані за теоретичним законом розподілу (теоретичні частоти).

З формулі (7.1) видно, що у випадку, коли відповідні теоретичні та емпіричні частоти співпадають, $\chi^2 = 0$. Отже, чим ближче χ^2 до нуля, тим краще узгоджуються вибіркові дані та обраний теоретичний закон розподілу.

Розраховане значення критерію χ^2 порівнюється з його критичним значенням $\chi^2_{\alpha,l}$, яке знаходиться за статистичними таблицями (додаток 4, таблиця 3) або за допомогою вбудованої статистичної функції Excel **ХИ2ОБР(α,l)**. Параметри функції **ХИ2ОБР**: α – рівень значущості; l – степені вільності, $l = k - r - 1$, де k – кількість груп емпіричного розподілу, r – кількість параметрів теоретичного розподілу (наприклад, для нормального розподілу $r = 2$, оскільки параметрів два – a і σ). Якщо $\chi^2 < \chi^2_{\alpha,l}$, то гіпотеза про закон розподілу приймається. У протилежному випадку гіпотеза відкидається.

За *критерієм Романовського* розглядають величину

$$a = \frac{|\chi^2 - l|}{\sqrt{2l}},$$

де l – степені вільності. Якщо $a \geq 3$, то розбіжність між теоретичними та дослідними даними слід вважати не випадковою. Якщо $a < 3$, то таку розбіжність можна вважати випадковою, тобто емпіричні дані узгоджуються з обраним теоретичним розподілом.

Зauważення. У деяких статистичних таблицях критичне значення χ^2 надається залежно від рівня надійності γ , $\gamma = 1 - \alpha$.

Перевірка гіпотези про закон розподілу величини X здійснюється за такими пунктами:

- 1) З генеральної сукупності X здобувається вибірка і будується статистичний ряд.
- 2) Висувається гіпотеза про закон розподілу випадкової величини X .
- 3) Знаходяться вибіркові параметри обраного закону розподілу.
- 4) Розраховуються теоретичні частоти.
- 5) Розраховується критерій χ^2 за формулою (7.1).

6) Обирається рівень значущості α (або рівень надійності γ) і знаходиться критичне значення $\chi^2_{\alpha,l}$ (або $\chi^2_{\gamma,l}$).

7) Порівнюються розраховане і критичне значення критерію χ^2 і робиться висновок про справедливість висунutoї гіпотези.

Приклади перевірки законів розподілу випадкової величини

Приклад 1. На одній з міських АТС фіксувалася кількість телефонних дзвінків в годину. Спостереження велися протягом 100 годин, їх результати представлені в таблиці 7.1. Чи можна вважати навантаження на АТС стандартним?

Таблиця 7.1

Кількість викликів в годину	0	1	2	3	4	5	6	7
Кількість спостережень	6	27	26	20	10	5	5	1

Розв'язання. Навантаження на АТС можна вважати стандартним, якщо випадкова величина X – кількість телефонних дзвінків, що поступили, підкоряється закону розподілу Пуассона. Тому необхідно перевірити гіпотезу про закон розподілу випадкової величини. Сформулюємо гіпотези:

H_0 – випадкова величина X підкоряється закону розподілу Пуассона;

H_1 – випадкова величина X не підкоряється закону розподілу Пуассона.

Означення. Закон Пуассона має вигляд:

$$p_k = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots; \lambda > 0, \quad (7.2)$$

де λ – параметр розподілу. Крім того, відомо, що $\bar{x} = \lambda$; $s^2 = \lambda$. Отже, для встановлення параметра λ достатньо знайти \bar{x} , обчислити s^2 та порівняти їх.

Випадкова величина X – кількість викликів в годину; тоді кількість спостережень – це відповідні значенням X частоти n_i , а таблиця 7.2 є

статистичним рядом і емпіричним законом розподілу величини X . Знайдемо \bar{x} і s^2 . Для зручності обчислення оформимо у вигляді таблиці (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	Суми
n_i	6	27	26	20	10	5	5	1	100
$x_i n_i$	0	27	52	60	40	25	30	7	241
$(x_i - \bar{x})^2 n_i$	34,85	53,68	4,37	6,96	25,28	33,54	64,44	21,07	244,19

Отже,

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i n_i = \frac{1}{100} \cdot 241 = 2,41; \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 n_i = \frac{1}{100} \cdot 244,19 \approx 2,44.$$

Оскільки повинна виконуватися рівність $\bar{x} = \lambda$; $s^2 = \lambda$, то як параметр можна вибрати або \bar{x} , або s^2 , або їх середнє арифметичне. Виберемо $\lambda = \frac{\bar{x} + s^2}{2} \approx 2,426$. Таким чином, гіпотеза H_0 – це припущення, що величина X розподілена згідно із законом Пуассона за формулою (7.2).

Перевіримо правильність гіпотези за допомогою критерію Пірсона. Знайдемо теоретичні частоти, використовуючи формулу (7.2):

$$p_k = \frac{e^{-2,426} 2,426^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

де за k візьмемо значення X , тобто x_i .

Відмітимо, що p_i – ймовірність того, що X прийме значення x_i , тобто статистично вони є відносними частотами, теоретичні частоти знаходитимемо за формулою: $n'_i = np_i$.

Для зручності при обчисленні теоретичних частот продовжимо таблицю, складену на основі статистичного ряду (табл. 7.2).

Отже, за результатами розрахунків $\chi^2 = \sum_{i=0}^7 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 5,739$.


Для даного завдання $l = k - r - 1 = 8 - 1 - 1 = 6$. Виберемо рівень значущості $\alpha = 0,01$ і знайдемо за допомогою таблиць або функції **ХИ2ОБР** табличного

процесора Excel значення $\chi^2_{\alpha,l}$: $\chi^2_{0,01;6}=16,812$. Оскільки для такого рівня надійності, тобто $\gamma=0,99$: $\chi^2 < \chi^2_{\alpha,l}$, то гіпотезу H_0 про розподіл Пуассона можна прийняти.

Таблиця 2.7

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	Суми
n_i	6	27	26	20	10	5	5	1	100
$p_i = \frac{e^{-2,426} 2,426^{x_i}}{x_i!}$	0,09	0,21	0,26	0,21	0,13	0,06	0,03	0,01	
$n'_i = np_i$	8,84	21,44	26,01	21,03	12,76	6,19	2,50	0,87	
$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$	0,91	1,44	4,65E-06	0,05	0,59	0,23	2,49	0,02	5,739

Зauważення. В таблицю внесено для ймовірності p_i наближені значення, а на рис. 7.1 точніші, обчислені за допомогою статистичної функції **ПУАССОН** табличного процесора Excel . Також показано використання вбудованої функції **ХИ2ОБР**.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
D8				f _x	=ХИ2ОБР(0,01;6)						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	Суми	
2	n_i	6	27	26	20	10	5	5	1	100	
3	p_i	0,08839	0,214433	0,260108	0,21034	0,127571	0,061898	0,025027	0,008674	0,996441	
4	$n'_i = np_i$	8,838969	21,44334	26,01077	21,03404	12,75715	6,189767	2,502729	0,867374		
5	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$	0,911842	1,439911	4,46E-06	0,050834	0,59589	0,228691	2,491824	0,020279	5,739276	
6											
7											
8				Критерій	16,81189						
9											

Рис. 7.1. Використання функції **ХИ2ОБР**

Висновок. Навантаження на АТС можна вважати стандартним.

Приклад 2. З метою впорядкування роботи міського суспільного транспорту фіксувався час очікування в хвилинах пасажирами тролейбусів на декількох маршрутах. Було проведено 200 вимірювань, їх результати записані в

таблиці 7.3. Чи можна вважати, що перевезення за перевіреними маршрутами забезпечені раціонально?

Таблиця 7.3

Час очікування	1 – 3	3 – 5	5 – 7	7 – 9	9 – 11	11 – 13
Кількість спостережень	25	30	48	35	42	20

Розв'язання. Можна вважати, що перевезення по перевірених маршрутах забезпечені раціонально, якщо випадкова величина X – час очікування пасажирами транспорту підкоряється рівномірному закону розподілу. Отже, задача зводиться до перевірки гіпотези про рівномірний закон розподілу випадкової величини. Сформулюємо гіпотези:

H_0 – випадкова величина X розподілена рівномірно;

H_1 – випадкова величина X не розподілена рівномірно.

Означення. Щільність розподілу випадкової величини, яка є *рівномірно розподіленою*, має вигляд

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & x < a, x > b, \end{cases}, \quad (7.3)$$

де a ; b – параметри розподілу.

Відомо, що $\bar{x} = \frac{a+b}{2}$; $s^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$, тобто для встановлення параметрів a

і b потрібно знайти \bar{x} і s^2 , після чого розв'язати систему

$$\begin{cases} \bar{x} = \frac{a+b}{2}, \\ s^2 = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{cases} \quad (7.4)$$

Оскільки за умови задачі випадкова X – час очікування транспорту, то кількість спостережень – це відповідні значенням X частоти n_i , а таблиця 7.3 – це інтервальний статистичний ряд і емпіричний закон розподілу X . Зайдемо \bar{x} і s^2 . За x_i візьмемо середини відповідних інтервалів. Для зручності обчислення оформимо у вигляді таблиці (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

$[a_i; a_{i+1})$	1 – 3	3 – 5	5 – 7	7 – 9	9 – 11	11 – 13	Суми
x_i	2	4	6	8	10	12	
n_i	25	30	48	35	42	20	200
$x_i n_i$	50	120	288	280	420	240	1398
$(x_i - \bar{x})^2 n_i$	622,5	268,2	47,045	35,704	380,52	502	1856

$$\text{Отже, } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 x_i n_i = \frac{1}{200} \cdot 1398 = 6,99; \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 n_i = \frac{1}{200} \cdot 1856 \approx 9,2799.$$

Складемо систему (7.4) для визначення параметрів рівномірного розподілу і розв'яжемо її:

$$\begin{cases} 6,99 = \frac{a+b}{2} \\ 9,2799 = \frac{(b-a)^2}{12} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b = 13,98 \\ (b-a)^2 = 111,3588 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b = 13,98 \\ b-a \approx 10,55 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \approx 1,715 \\ b \approx 12,265 \end{cases}.$$

Таким чином, гіпотеза H_0 – це припущення, що X розподілена за рівномірним законом із щільністю розподілу:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{12,265 - 1,715} = \frac{1}{10,55}, & 1,715 \leq x \leq 12,265 \\ 0, & x < 1,715, \quad x > 12,265 \end{cases}.$$

Перевіримо справедливість гіпотези H_0 за допомогою критерію Пірсона. Для знаходження теоретичних частот використаємо формулу $n'_i = np_i$, а ймовірності попадання в інтервали p_i знайдемо за формулою

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}.$$

Для зручності обчислень теоретичних частот складемо таблицю (табл. 7.5). Врахуємо, що $\beta - \alpha = 2$; $b - a = 12,265 - 1,715 = 10,55$ для всіх інтервалів, окрім першого і останнього.

Для першого інтервалу $\beta - \alpha = \beta - a = 3 - 1,715 = 1,285$; для останнього інтервалу $\beta - \alpha = b - \alpha = 12,265 - 11 = 1,265$.

Таблиця 7.5

$[a_i; a_{i+1})$	1 – 3	3 – 5	5 – 7	7 – 9	9 – 11	11 – 13	Суми
n_i	25	30	48	35	42	20	200
$\beta - \alpha$	1,285	2	2	2	2	1,265	
$p_i = \frac{\beta - \alpha}{10,55}$	0,122	0,19	0,19	0,19	0,19	0,12	
$n'_i = np_i$	24,360	37,915	37,915	37,915	37,915	23,981	
$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$	0,017	1,6522	2,6827	0,2241	0,4402	0,6609	5,677

$$\text{Отже, } \chi^2 = \sum_{i=0}^7 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 5,677.$$

Для даного завдання $l = k - r - 1 = 6 - 2 - 1 = 3$. Виберемо рівень значущості $\alpha = 0,01$ і знайдемо за допомогою таблиць або функції **ХИ2ОБР** табличного процесора Excel значення $\chi^2_{\alpha,l}$: $\chi^2_{0,01,3} = 11,34$. Оскільки для такого рівня надійності (0,99) $\chi^2 < \chi^2_{\alpha,l}$, то гіпотезу про рівномірний розподіл приймаємо.

Висновок. Перевезення за перевіреними маршрутами організовані раціонально.

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

1. За даними додатку 2.1 побудувати гістограму розподілу, перевірити правильність гіпотези H_0 – випадкова величина X *розподілена згідно із законом Пуассона* за допомогою критерію Пірсона та Романовського.

2. За даними додатку 3 (дані вимірювань при стабільній подачі фарби та зволожувального розчину) для одного із показників (вказана величина в таблиці значень є усереднене значення п'яти вимірювань, тому всіх даних, відповідно, не 16, а 80):

- 1) побудувати таблицю статистичного розподілу;
- 2) побудувати гістограму;

- 3) вирівняти дослідні дані за допомогою закону із рівномірною щільністю;
- 4) перевірити узгодженість між емпіричними та теоретичними даними за допомогою критерія Пірсона.

Зauważення. Для виконання завдань 1), 2) використовувати набуті навики лабораторної роботи №5). Номер варіанта відповідає номеру ділянки, варіанти 1 та 2 є, відповідно, варіантами 11 та 12.

Теоретичні запитання до теми

1. Гіпотези, їх різновиди.
2. Помилки першого і другого роду, їх визначення.
3. Описати критерії згоди, їх застосування та використання.
4. Описати рівномірний закон розподілу, його числові характеристики.
5. Пояснити вигляд гістограми для розподілу Пуассона, записавши вигляд його диференціальної функції розподілу та вказавши параметр λ .

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображаються формули теоретичної частини (обов'язковим є дотримання пунктів теоретичних запитань для теми), хід роботи та отримані результати. При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівняти отримані результати проведених обчислень, а також знати відповіді на теоретичні запитання. Також студент здає електронний варіант проведених обчислень практичних задач, причому із повним описанням всіх використаних можливостей табличного процесора Microsoft Excel.

Лабораторна робота № 8

Статистична перевірка гіпотези про нормальній закон розподілу

Мета роботи: навчитись перевіряти гіпотезу про нормальній закон розподілу величини X , використовуючи теоретичні знання та всі набуті навики обчислень за допомогою застосування табличного процесора Microsoft Excel.

Теоретичні відомості

Центральна гранична теорема – теорема теорії ймовірності про збіжність розподілу суми незалежних однаково розподілених випадкових величин до нормального розподілу. Вона і підкреслює особливість нормального розподілу.

Теорема Ляпунова. Якщо для послідовності попарно незалежних випадкових величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ можна знайти таке число $\delta > 0$, що

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n M|X_k - M(X_k)|^{2+\delta}}{\left(\sqrt{\sum_{k=1}^n D(X_k)} \right)^{2+\delta}} = 0,$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n M(X_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n D(X_k)}} < x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Зauważення. На практиці зазвичай найлегше перевірити умову Ляпунова для $\delta = 1$. Якщо послідовність випадкових величин задовольняє умову Ляпунова, то вона задовольняє також умову Ліндценберга. Обернене твердження неправильне.

Теорема Лінденберга-Леві. Якщо попарно незалежні випадкові величини $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ однаково розподілені і мають математичне сподівання a і дисперсію σ^2 , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - na}{\sigma \sqrt{n}} < x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

За теоремою Ляпунова вплив кожного окремого доданка на суму при великих n дуже малий, і у разі необмеженого збільшення кількості доданків закон розподілу їх суми необмежено наближається до нормальног з математичним сподіванням і дисперсією, які дорівнюють сумам відповідних числових характеристик доданків.

Центральна гранична теорема пояснює велике поширення нормального закону розподілу і є теоретичною основою застосування нормального розподілу для багатьох практичних задач: *за широких припущень сума великого (але скінченного) числа незалежних випадкових величин розподілена згідно із законом, близьким до нормального.* Наприклад, на відлагодженому виробництві якість продукції змінюється за нормальним законом внаслідок того, що виробнича похибка є результатом сумарної дії великого числа випадкових величин. Окремим випадком центральної граничної теореми є інтегральна формула Лапласа.

Центральна гранична теорема пояснює достатньо широке застосування нормального закону розподілу: *якщо випадкова величина формується під впливом багатьох незалежних факторів, кожен з яких здійснює на неї незначний вплив, то розподіл цієї величини близький до нормального.* Отже, важливими є вміння перевірки відповідності вибіркових даних нормальному розподілу.

Порядок дій при перевірці статистичних гіпотез

Для перевірки правильності основної статистичної гіпотези H_0 необхідно:

- 1) визначити гіпотезу H_1 , альтернативну до гіпотези H_0 ;

- 2) обрати статистичну характеристику перевірки;
- 3) визначити допустиму ймовірність похибки першого роду, тобто рівень значущості α ;
- 4) знайти за відповідною таблицею критичну область (критичну точку) для обраної статистичної характеристики.

До критичної області належать такі значення статистичної характеристики, при яких гіпотеза H_0 відхиляється на користь альтернативної гіпотези H_1 .

Критерій згоди χ^2 про вигляд нормального розподілу

Критерій згоди χ^2 можна використовувати для будь-яких розподілів. Розглянемо його для перевірки гіпотези H_0 : генеральна сукупність має нормальній закон розподілу $N(a, \sigma^2)$, де $a = \bar{x}$, $\sigma^2 = s^2$.

Розбиваємо числову вісь на r інтервалів, що не перетинаються: $h_1, h_2, \dots, h_r; n_i$ – кількість елементів вибірки, що потрапили в інтервал h_i ($i = 1, 2, \dots, r$). Позначимо через $p_i = P(X \in h_i)$; тоді np_i – теоретичні частоти. За формулою обчислення ймовірності

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right) \quad (8.1)$$

для нормального розподілу одержимо при $a = \bar{x}$, $\sigma = s$, $h_i = (x_i, x_{i+1})$

$$p_i = P(x_i < X < x_{i+1}) = \Phi\left(\frac{x_{i+1} - \bar{x}}{s}\right) - \Phi\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right).$$

За критерій перевірки гіпотези H_0 беруть величину

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}. \quad (8.2)$$

Число k степенів вільності дорівнює $k = r - l - 1$, де l – кількість параметрів розподілу. Для нормального розподілу $k = r - 3$.

За умови справедливості нульової гіпотези за даним рівнем значущості α і кількістю степенів вільності k за таблицею розподілу χ^2 знаходимо критичну

точку $\chi^2_{k;\alpha}$ з рівності $P(\chi^2 > \chi^2_{k;\alpha}) = \alpha$. Якщо $\chi^2 < \chi^2_{k;\alpha}$, то гіпотеза H_0 приймається, якщо $\chi^2 \geq \chi^2_{k;\alpha}$, то гіпотеза H_0 відхиляється. У випадку, коли гіпотеза відкидається, необхідно, по-перше, збільшити обсяг вибірки (кількість випробувань) і провести нову перевірку, якщо це не допоможе, то треба знайти інший вираз для закону розподілу.

Висновок. Для того, щоб при заданому рівні значущості α перевірити гіпотезу про нормальній розподіл генеральної сукупності, треба:

1. Обчислити вибіркову середню \bar{x} і вибіркове середнє квадратичне відхилення σ .

2. Обчислити теоретичні частоти.

Якщо ознака X генеральної сукупності має неперервний розподіл імовірностей, то теоретичні частоти обчислюються за формулою

$$n'_i = np_i, \quad (8.3)$$

де n – обсяг вибірки, а p_i – імовірність того, що випадкова величина X потрапить в i -й частковий інтервал. Вона обчислюється в загальному випадку за формулами того закону розподілу, який припускаємо на основі обробки статистичного розподілу вибірки.

Якщо є підстави для припущення, що ознака генеральної сукупності X має нормальній закон розподілу, то теоретичні частоти можна обчислювати за формулами:

$$n'_i = \frac{nh}{\sigma} \cdot \varphi(u_i) = \frac{nh}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i - \bar{x}_B)^2}{2\sigma^2}}, \quad (8.4)$$

де n – обсяг вибірки; h – довжина часткового інтервалу; \bar{x}_B – вибіркова середня величина; σ – вибіркове середнє квадратичне відхилення; $\varphi(u_i)$ – щільність імовірностей для загального нормального закону розподілу або також за формулою

$$n'_i = n \cdot \left(\Phi\left(\frac{x_{i+1} - \bar{x}_B}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_i - \bar{x}_B}{\sigma}\right) \right), \quad (8.5)$$

де $\Phi\left(\frac{x_{i+1} - \bar{x}_B}{\sigma}\right)$, $\Phi\left(\frac{x_i - \bar{x}_B}{\sigma}\right)$ – функції Лапласа.

3. Порівняти емпіричні і теоретичні частоти за допомогою критерію Пірсона. Для цього обчислити значення критерію за формулою (8.2).

4. За таблицею критичних точок розподілу χ^2 за заданим рівнем значущості α та числу степенів вільності знаходить критичну точку $\chi^2_{k;\alpha}$ та роблять відповідні висновки стосовно зробленої гіпотези.

Приклади перевірки статистичних гіпотез

Приклад 1. За заданим інтервальним статистичним розподілом випадкової величини X – маса новонароджених дітей (табл.8.1),

Таблиця 8.1

$h=0,5$	1–1,5	1,5–2	2–2,5	2,5–3	3–3,5	3,5–4	4–4,5
n_i	10	20	50	35	28	15	12

при рівні значущості $\alpha = 0,01$ перевірити правильність H_0 про нормальний закон розподілу ознаки X – маси новонароджених дітей.

Розв’язання. Для визначення теоретичних частот $n'_i = np_i$ необхідно обчислити \bar{x}_B , σ .

Дискретний статистичний розподіл буде таким:

x_i	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25
n_i	10	20	50	35	28	15	12

$$n = \sum n_i = 170.$$

$$\bar{x}_B = \frac{\sum x_i n_i}{n} = \frac{12,5 + 35 + 112,5 + 96,25 + 91 + 56,25 + 51,0}{170} = \frac{454,5}{170} = 2,67;$$

$$\frac{\sum x_i^2 n_i}{n} = \frac{1,25^2 \cdot 10 + 1,75^2 \cdot 20 + 2,25^2 \cdot 50 + 2,75^2 \cdot 35 + 3,25^2 \cdot 28 + 3,75^2 \cdot 15 + 4,25^2 \cdot 12}{170} = \frac{1318,125}{170} = 7,75;$$

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 n_i}{n} - (\bar{x}_B)^2 = 7,75 - (2,67)^2 = 7,75 - 7,1289 = 0,6211;$$

$$\sigma = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,6211} \approx 0,79.$$

Обчислення теоретичних частот подано в таблиці (8.2):

Таблиця 8.2

x_i	x_{i+1}	n_i	$z_i = \frac{x_i - \bar{x}_B}{\sigma_B}$	$z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}_B}{\sigma_B}$	$\Phi(z_i)$	$\Phi(z_{i+1})$	$n'_i = n(\Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i))$
1	1,5	10	-2,11	-1,48	-0,4821	0,4306	9
1,5	2	20	-1,48	-0,85	-0,4306	0,3023	22
2	2,5	50	-0,85	-0,22	-0,3023	0,0871	37
2,5	3	35	-0,22	0,42	-0,0871	0,1628	43
3	3,5	28	0,42	1,05	0,1628	0,3531	32
3,5	4	15	1,05	1,68	0,3531	0,4535	17
4	4,5	12	1,68	2,32	0,4535	0,4898	6

Обчислення спостережуваного значення статистичного критерію χ^2 дається нижче в таблиці 8.3:

Таблиця 8.3

n_i	np_i	$n_i - np_i$	$(n_i - np_i)^2$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
10	9	-1	1	0,11
20	22	-2	4	0,18
50	37	13	169	4,57
35	43	-12	144	3,35
28	32	-4	16	0,5
15	17	-2	4	0,24
12	6	6	36	6

Отже, маємо

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = 14,95.$$

За таблицею знаходимо значення

$$\chi_{\text{кр}}^2(\alpha = 0,01; k = 7 - 2 - 1 = 4) = \chi_{\text{кр}}^2(0,01; 4) = 13,3.$$

Правобічна критична область показана на рис. 8.1.




Рис. 8.1. Зображення критичної області та точки

Висновок. Оскільки $\chi^2 \in [0; 13,3]$, то не маємо підстав для прийняття H_0 про нормальній закон розподілу ознаки генеральної сукупності X .

Приклад 2. Вимірювання зросту юнаків віком 17 років (табл.8.4) дав такі результати:

Таблиця 8.4

$h = 4$	154–158	158–162	162–166	166–170	170–174	174–178	178–182	182–186
n_i	8	14	20	32	12	8	4	2

Визначити гіпотетично, який закон розподілу має ознака X – зріст юнака. При рівні значущості $\alpha = 0,01$ перевірити правильність висунутої нульової гіпотези.

Розв'язання. Для заданого статистичного розподілу побудуємо гістограму частот (рис. 8.2).




Рис. 8.2. Гістограма частот

За формою гістограми частот можемо припустити, що ознака X має нормальній закон розподілу. Отже, висуваємо нульову гіпотезу H_0 : ознака X має нормальній закон розподілу ймовірностей. Для перевірки справедливості H_0 використаємо критерій узгодженості Пірсона.

Отже, необхідно обчислити теоретичні частоти, а для цього знайдемо значення \bar{x}_B , σ , побудувавши дискретний розподіл за заданим інтервальним, а саме:

x_i	156	160	164	168	172	176	180	184
n_i	8	14	20	32	12	8	4	2

$$\bar{x}_B = \frac{\sum x_i n_i}{n} = \frac{156 \cdot 8 + 160 \cdot 14 + 164 \cdot 20 + 168 \cdot 32 + 172 \cdot 12 + 176 \cdot 8 + 180 \cdot 4 + 184 \cdot 2}{100} = \frac{16704}{100} = 167,04;$$

$$\frac{\sum x_i^2 n_i}{n} = \frac{156^2 \cdot 8 + 160^2 \cdot 14 + 164^2 \cdot 20 + 168^2 \cdot 32 + 172^2 \cdot 12 + 176^2 \cdot 8 + 180^2 \cdot 4 + 184^2 \cdot 2}{100} = \frac{2794304}{100} = 27943,04;$$

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 n_i}{n} - (\bar{x}_B)^2 = 27943,04 - (167,04)^2 = \\ = 27943,04 - 27902,3616 = 40,68;$$

$$\sigma = \sqrt{s^2} = \sqrt{40,68} \approx 6,38.$$

Обчислення теоретичних частот наведено в табл. 8.5:

Таблиця 8.5

x_i	x_{i+1}	n_i	$z_i = \frac{x_i - \bar{x}_B}{\sigma_B}$	$z_{i+1} = \frac{x_{i+1} - \bar{x}_B}{\sigma_B}$	$\Phi(z_i)$	$\Phi(z_{i+1})$	$n'_i = n(\Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i))$
154	158	8	-2,04	-1,42	-0,4793	-0,4222	6
158	162	14	-1,42	-0,79	-0,4222	-0,2852	14
162	166	20	-0,79	-0,16	-0,2852	-0,0636	22
166	170	32	-0,16	0,464	-0,0636	0,1772	24
170	174	12	0,464	1,09	0,1772	0,3621	19
174	178	8	1,09	1,72	0,3621	0,4573	10
178	182	4	1,72	2,34	0,4573	0,4904	3
182	186	2	2,34	2,97	0,4904	0,4986	1

Обчислення спостережуваного значення χ^2 наведено нижче в таблиці:

n_i	np_i	$n_i - np_i$	$(n_i - np_i)^2$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
8	6	2	4	0,667
14	14	0	0	0
20	22	-2	4	0,182
32	24	8	64	2,667
12	19	-7	49	2,579
8	10	-2	4	0,4
4	3	1	1	0,333
2	1	1	1	1

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^8 \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = 7,828.$$

За таблицею (додаток 8) знаходимо значення

$$\chi^2_{\alpha,k} (\alpha = 0,01; k = 8 - 2 - 1) = \chi^2_{\alpha,k} (0,01; 5) = 15,1.$$

Критична область даного прикладу зображена на рис.8.3.




Рис. 8.3. Критична область

Висновок. Оскільки $\chi^2 \in [0; 15,1]$, немає підстав для відхилення нульової гіпотези H_0 про нормальний закон розподілу ймовірностей ознаки X .

Приклад 3. За наданим інтервальним статистичним рядом (табл. 8.6) знайти закон розподілу випадкової величини X .

Таблиця 8.6

$[a_i; a_{i+1})$	$[-2;-1,2)$	$[-1,2;-0,4)$	$[-0,4;0,4)$	$[0,4;1,2)$	$[1,2;2)$
n_i	6	11	21	7	5

Розв'язання. Для визначення виду закону розподілу побудуємо гістограму за даними таблиці 8.6 (рис. 8.1). За видом гістограми висуваємо гіпотезу про нормальний закон розподілу даної випадкової величини:

H_0 – випадкова величина X розподілена за нормальним законом;

H_1 – випадкова величина X не розподілена за нормальним законом.




Рис. 8.1. Гістограма за даними таблиці 8.6

Щільність розподілу випадкової величини, розподіленої за нормальним

законом має вид $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$, де a і σ – параметри розподілу.

Знайдемо означені параметри, враховуючи, що $\bar{x} = a$; $S^2 = \sigma^2$. Розрахунки оформимо у вигляді таблиці (табл. 8.7).

Таблиця 8.7

$[a_i; a_{i+1})$	$[-2; -1,2)$	$[-1,2; -0,4)$	$[-0,4; 0,4)$	$[0,4; 1,2)$	$[1,2; 2)$
n_i	6	11	21	7	5
x_i	-1,6	-0,8	0	0,8	1,6
$x_i n_i$	-9,6	-8,8	0	5,6	8
$(x_i - \bar{x})^2 n_i$	13,572	5,452	0,194	5,620	14,382

Знайдемо вибіркове середнє, вибіркову дисперсію і вибіркове середнє квадратичне відхилення за відповідними формулами:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = \frac{1}{50} (-1,6 \cdot 6 - 0,8 \cdot 11 + 0 \cdot 21 + 0,8 \cdot 7 + 1,6 \cdot 5) = -0,096;$$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i = \frac{1}{50} (13,572 + 5,452 + 0,194 + 5,620 + 14,382) = 0,7844;$$

$$\sigma = \sqrt{s^2} \approx 0,886.$$

Отже, параметрами теоретичного закону розподілу є величини:
 $\bar{x} = a = -0,096$; $s = \sigma = 0,886$.

Для знаходження значення критерію χ^2 розрахуємо теоретичні частоти n'_i . Для зручності обчислень побудуємо табл. 8.8.

Таблиця 8.8

$[a_i; a_{i+1})$	$[-2;-1,2)$	$[-1,2;-0,4)$	$[-0,4;0,4)$	$[0,4;1,2)$	$[1,2;2)$
n_i	6	11	21	7	5
x_i	-1,6	0,8	0	0,8	1,6
$x_i n_i$	-9,6	8,8	0	5,6	8
$(x_i - \bar{x})^2 n_i$	13,572	5,452	0,194	5,620	14,382
$\frac{a_i - \bar{x}}{S}$	-2,1498	-1,2465	-0,3433	0,56	1,4633
$\Phi(\frac{a_i - \bar{x}}{S})$	-0,958	-0,785	-0,266	0,425	0,856
p_i	0,0856	0,2595	0,3455	0,2155	0,063
$n'_i = np_i$	4,325	12,975	17,275	10,775	3,15
$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$	0,649	0,301	0,803	1,323	1,087

За формулою критерію маємо

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} \approx 4,16.$$

Знайдемо критичне значення $\chi^2_{\alpha,l}$, враховуючи, що $l = k - r - 1 = 5 - 2 - 1 = 2$.

Рівень значущості α оберемо рівним 0,1. За допомогою Excel знаходимо **ХИ2ОБР(0,1; 2)=4,6**.

Отже, оскільки $\chi^2 < \chi^2_{\alpha,l}$, гіпотеза H_0 про нормальний розподіл приймається, гіпотеза H_1 відкидається.

Дані вимірювань на одному із поліграфічних виробництв та їх статистична обробка

Приклад 4. Дані вимірювань з перших трьох текстових накладів, друкування яких здійснювалось в різні дні декілька разів по 100 відбитків, було використано для перевірки підлягання отриманих значень у вибірках нормальному закону розподілу за критерієм Пірсона.

Розглядається приклад перевірки нормальному розподілу вибірки з вимірювання значень, отриманих на ділянці дії фарбового ножа № 3 для тесту, де вимірювання було проведено на відбитку № 90, для якого значення можна вважати стабілізованими. В табл. 8.9 наведено дані поведених вимірювань, де ΔE – колірні відмінності виміряного кольору від еталонного значення, D – оптична густина фарби, 80, 40 – розтискування растрової точки ($80+k$, вказано k) при стабільній подачі фарби та зволожувального розчину.

Таблиця 8.9

Результати вимірювання відбитка з тестовим зображенням

№ вимірювання	ΔE	D	$\Delta S_{\text{відн}}$	
			80%	40%
1	2	3	4	5
1	16,24	0,89	5	6
2	16,11	0,89	5	7
3	16,21	0,86	5	7
4	16,25	0,89	4	7
5	16,19	0,93	4	7
6	16,18	0,9	5	7
7	16,31	0,91	5	7
8	16,17	0,97	5	7
9	16,2	0,91	5	7
10	16,12	0,9	5	7
11	16,22	0,92	4	7
12	16,18	0,94	5	7
13	16,23	0,88	5	7

14	16,09	0,89	5	6
15	16,25	0,93	5	7
16	16,17	0,89	4	7
17	16,21	0,87	4	7
18	16,25	0,89	5	7
19	16,19	0,92	4	7
20	16,16	0,93	5	7
21	16,2	0,89	5	7
22	16,19	0,95	5	6
23	16,28	0,93	5	7
24	16,13	0,91	4	7
25	16,17	0,9	5	7
26	16,2	0,91	5	7
27	16,28	0,93	5	7
28	16,15	0,91	5	7
29	16,17	0,9	4	7
30	16,2	0,91	5	7
31	16,12	0,9	4	7
32	16,22	0,92	5	7
33	16,18	0,94	4	7
34	16,29	0,88	5	7
35	16,09	0,89	5	7
36	16,25	0,93	5	6
37	16,11	0,89	5	7
38	16,21	0,87	5	7
39	16,09	0,89	5	7
40	16,24	0,9	5	7
41	16,11	0,89	4	7
42	16,31	0,87	5	7
43	16,25	0,89	4	7
44	16,19	0,92	5	7
45	16,22	0,88	5	6
$\langle X \rangle$	16,2	0,9	4,73	6,89
σ	0,0596	0,0234	0,4539	0,2939

У наведеній вище таблиці одразу подано пораховані значення середнього арифметичного значення вибірки та середньоквадратичного відхилення.

Згідно з методикою розрахунку за критерієм Пірсона, визначаємо інтервали для кожної з вибірок (для ΔE , D , ΔS відн 80 % та ΔS відн 40 %) та кількість значень, що у них потрапляють. Розраховуємо ймовірності потрапляння випадкового значення у задані інтервали відповідно до очікуваного середнього значення та середньоквадратичного відхилення, використовуючи функцію пакету MS Excel **НОРМРСП**($x; x_{cp}; \sigma; 1$).

Після цього, коригуючи отримані значення ймовірностей (за необхідної для критерію Пірсона умови, що сума ймовірностей обов'язково повинна бути рівною 1), розраховуємо величини χ^2 -статистики.

Розраховане значення порівнюємо з критичним, яке також попередньо розрахуємо за формулою в MS Excel **ХИ2ОБР**($\alpha; k$). Для кожної з вибірок кількість степенів вільності буде дещо відрізнятись, наприклад, у даному випадку для вибірки за ΔE $k = 2$, для вибірки за D $k = 9$, а для вибірок за ΔS відн 80 % за ΔS відн 40 % $k = 1$.

У всіх випадках розрахунки показують, що оскільки значення величин χ^2 є меншими за значення $\chi^2_{\text{крит}}$ ($5,723 < 5,99146$; $12,39 < 16,9189$; $2,837 < 3,8414$; $1,007 < 3,8414$), то гіпотеза про відповідність вибірок нормальному закону розподілу приймається.

Зауваження. Обчислення проведено за допомогою функцій пакету MS Excel.

В табл. Б.1, Б.2, Б.3 та Б.4 показані розрахунки відповідності нормальному розподілу вибірки даних за ΔE , за D , за ΔS відн 80 % та ΔS відн 40 %, відповідно.

Зауваження. В таблицях нижче ряд даних є наближеними, тому можливі, на перший погляд, неточності.

Таблиця Б.1

Розрахунок відповідності нормальному розподілу вибірки за ΔE

Знач. ΔE	К-ть елем. n_i	$x_{i\min}$	$x_{i\max}$	$P(x_{i\min})$	$P(x_{i\max})$	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,10	8,00	16,075	16,125	0,022	0,120	0,098	4,6	3,4	2,585
16,15	7,00	16,125	16,175	0,120	0,368	0,248	11,6	-4,6	1,820
16,20	17,00	16,175	16,225	0,368	0,692	0,324	15,1	1,9	0,228
16,25	8,00	16,225	16,275	0,692	0,910	0,218	10,2	-2,2	0,467
16,30	5,00	16,275	16,325	0,910	0,985	0,075	3,5	1,5	0,623

 $n=45$ $\Sigma=0,963$ $\chi^2=5,723$

5,9914645

 $n^*=47$ $\chi^2_{\text{крит}}=4$ $k=2,00$

Таблиця Б.2

Розрахунок відповідності нормальному розподілу вибірки за D

Знач. ΔE	К-ть елем.	$x_{i\min}$	$x_{i\max}$	$P(x_{i\min})$	$P(x_{i\max})$	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,86	1,00	0,855	0,865	0,017	0,045	0,028	1,3	-0,3	0,067
0,87	3,00	0,865	0,875	0,045	0,103	0,058	2,6	0,4	0,050
0,88	3,00	0,875	0,885	0,103	0,201	0,098	4,5	-1,5	0,494
0,89	12,00	0,885	0,895	0,201	0,340	0,139	6,4	5,6	4,936
0,9	6,00	0,895	0,905	0,340	0,506	0,166	7,6	-1,6	0,335
0,91	6,00	0,905	0,915	0,506	0,607	0,165	7,5	-1,5	0,318
0,92	4,00	0,915	0,925	0,670	0,807	0,137	6,3	-2,3	0,823
0,93	6,00	0,925	0,935	0,807	0,902	0,095	4,4	1,6	0,620
0,94	2,00	0,935	0,945	0,902	0,957	0,027	2,5	-0,5	0,111
0,95	1,00	0,945	0,955	0,957	0,984	0,011	1,2	-0,2	0,042
0,96	0,00	0,955	0,965	0,984	0,995	0,004	0,5	-0,5	0,498
0,97	1,00	0,965	0,975	0,995	0,999	0,004	0,2	0,8	4,098

 $n=45$ $\Sigma=0,982$ $\chi^2=12,390$ $n^*=46$ $\chi^2_{\text{крит}}=16,91897762$ $k=9,00$

Таблиця Б.3

Розрахунок відповідності нормальному розподілу вибірки за ΔS відн 80 %

Знач. ΔE	К-ть елем.	$x_{i \min}$	$x_{i \max}$	$P(x_{i \min})$	$P(x_{i \max})$	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,00	0,00	2,5	3,500	0,000	0,003	0,003	0,1	-0,1	0,148
4,00	12,00	3,500	4,500	0,003	0,304	0,300	13,5	-1,5	0,170
5,00	33,00	4,500	5,500	0,304	0,954	0,651	29,3	3,7	0,470
6,00	0,00	5,500	6,500	0,954	1,000	0,046	2,0	-2,0	2,049

$$n=45$$

$$\Sigma=1,000$$

$$\chi^2=2,837$$

$$n^*=45$$

$$\chi^2_{\text{крит}}=3,841459149$$

$$k=1,00$$

Таблиця Б.4

Розрахунок відповідності нормальному розподілу вибірки за ΔS відн 40 %

Знач. ΔE	К-ть елем.	$x_{i \min}$	$x_{i \max}$	$P(x_{i \min})$	$P(x_{i \max})$	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0,00	4,5	5,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000
6	5,00	5,500	6,500	0,000	0,093	0,093	4,2	0,8	0,161
7	40,00	6,500	7,500	0,093	0,981	0,888	40,0	0,0	0,000
8	0,00	7,500	8,500	0,981	1,000	0,019	0,8	-0,8	0,846

$$n=45$$

$$\Sigma=1,000$$

$$\chi^2=1,007$$

$$n^*=45$$

$$\chi^2_{\text{крит}}=3,841459149$$

$$k=1,00$$

На основі отриманих даних зроблено висновок про те, що дійсно дані експериментальних вимірювань підлягають нормальному розподілу.

Виконання лабораторної роботи

Завдання до теми

4. Користуючись теоретичними знаннями та засобами програмного забезпечення Excel, за даними додатку 2.2 (Дані для перевірки за нормальним законом):

- 1) Побудувати таблицю статистичного розподілу.
- 2) Побудувати гістограму.

- 3) Вирівняти дослідні дані за допомогою нормального закону розподілу.
- 4) Перевірити узгодженість між емпіричними та теоретичними даними за допомогою критерія Пірсона та Романовського.

5. За експериментальними даними вимірювань додатку 3, де ΔE – колірні відмінності виміряного кольору від еталонного значення, D – оптична густина фарби, 80, 40 – розтикування растрової точки ($80+k$, вказано k) при стабільній подачі фарби та зволожувального розчину та при коригуванні подачі фарби автоматизованою системою контролю параметрів відбитка для одного з наведених показників висунути гіпотезу про нормальний закон розподілу даної випадкової величини та перевірити її за критерієм Пірсона.

Зauważення. Номер варіанта відповідає номеру ділянки, варіанти 1 та 2 ϵ , відповідно, варіантами 11 та 12.

Теоретичні запитання до теми

1. Обґрунтувати практичне використання центральної граничної теореми.
2. Пояснити критерій згоди χ^2 про вигляд нормального розподілу.
3. Записати порядок дій перевірки гіпотези про нормальний розподіл генеральної сукупності.
4. Виписати формулі обчислення теоретичних частот для нормального розподілу та пояснити використання відповідної вбудованої функції в Excel для їх знаходження.
5. Побудова правобічної критичної області та визначення її критичної точки.

Оформлення звіту та порядок захисту

Лабораторна робота виконується на аркушах А4, в ній стисло відображаються формули теоретичної частини, хід роботи та отримані результати. При захисті студент повинен розуміти зміст роботи, порівняти отримані результати проведених обчислень, а також знати відповіді на

теоретичні запитання. Також студент здає електронний варіант проведених обчислень практичних задач.

Додаткове завдання

1. Оформити звіт про виконану роботу на аркушах А4 за допомогою Microsoft Word (з використанням обчислень за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, як рисунків в текстовому файлі).
2. Зібрати статистичні дані (або використати готові) та опрацювати їх (за тематикою лабораторних робіт 5-8).

Індивідуальні завдання для лабораторних робіт

Завдання 1. Серед n лотерейних квитків k виграшних. Навмання купили m квитків. Визначити ймовірність того, що серед них l виграшних.

Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	9	9	9	8	8
l	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2
m	4	3	5	5	5	4	5	8	8	5	4	5	3	4	5
k	6	6	7	6	7	8	7	5	3	4	6	6	7	5	4
Варіант	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
n	8	10	10	10	12	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9
l	3	4	5	4	4	2	2	2	3	1	2	3	2	4	3
m	4	6	7	6	8	3	3	4	5	4	3	4	6	5	5
k	5	5	7	7	6	4	5	3	4	2	5	4	3	5	4

Завдання 2. У ліфт k - поверхового будинку сіли n пасажирів ($n < k$). Кожний незалежно від інших із однаковою ймовірністю може вийти на довільному (починаючи з другого) поверсі. Визначити ймовірність того, що:

- 1) усі вийшли на різних поверхах;
- 2) хоча б двоє вийшли на одному поверсі.

Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
k	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	12	11	10	9	8
n	4	4	5	5	6	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4
Варіант	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
k	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	11	10	9	8
n	3	4	4	5	5	6	4	4	3	3	3	3	4	4	3

Завдання 3. Імовірність виграшу в лотерею на один квиток дорівнює p . Куплено n квитків. Знайти найбільше імовірне число виграшних квитків і відповідну ймовірність.

Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
n	10	14	13	12	11	15	11	13	14	10
Варіант	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
p	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
n	12	15	12	12	11	13	14	15	13	11

Завдання 4. Для дискретної випадкової величини відомий ряд розподілу.

Побудувати многокутник розподілу та графік функції розподілу даної випадкової величини. Знайти числові характеристики: $M(2X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$.

4.1.

x	-1	0	1	2
p_i	0,2	0,1	0,3	0,4

4.2.

x	-2	-1	0	2	4
p_i	1/3	2/15	1/5	2/15	3/15

4.3.

x	-1	2	3	5
p_i	0,2	0,3	0,4	0,1

4.4.

x	-1	0	1	2	3
p_i	1/4	1/4	1/8	1/8	1/4

4.5.

x	-2	-1	0	1
p_i	0,2	0,4	0,1	0,3

4.6.

x	-1	0	1	2	3
p_i	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2

4.7.

x	1	2	3	5
p_i	0,2	0,1	0,3	0,4

4.8.

x	-1	0	2	4	5
p_i	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3

4.9.

x	-3	-2	-1	1
p_i	0,3	0,2	0,1	0,4

4.10.

x	-3	-2	1	3	4
p_i	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1

4.11.

x	-3	-2	-1	0	1
p_i	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4

4.12.

x	-1	0	2	3	5
p_i	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3

4.13.

x	-3	-1	0	1
p_i	0,15	0,25	0,2	0,4

4.14.

x	-3	-2	-1	0	1
p_i	0,25	0,3	0,15	0,2	0,1

4.15.

x	-3	-2	0	-1
p_i	0,1	0,15	0,35	0,4

4.16.

x	-1	0	1	2
p_i	0,1	0,4	0,2	0,3

4.17.

x	0	1	2	3
p_i	0,1	0,2	0,4	0,3

4.18.

x	1	3	5	7
p_i	0,4	0,1	0,2	0,3

4.19.

x	-2	0	2	4
p_i	0,3	0,1	0,2	0,4

4.20.

x	-3	0	3
p_i	0,1	0,2	0,7

Завдання 5. За даними варіанту обчислити середні значення, середні квадратичні відхилення та коефіцієнт кореляції. Знайти рівняння обох ліній регресії та побудувати їх графіки.

Варіант 1		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	1,8	36,1
2	2,4	38,3
3	2,5	30,6
4	2,3	32,1
5	2,3	37,6
6	2,5	34,8
7	2,4	34,2
8	2,5	34,2
9	2,1	32,5

Варіант 2		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2	38,2
2	2,1	36,9
3	2,3	39,7
4	2,6	37,2
5	2,8	31,7
6	2,8	30,1
7	2,2	39,9
8	2,3	38,8
9	2,6	38,4

Варіант 3		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	3	29,4
2	2,6	35,4
3	2,3	39,7
4	2,5	37,1
5	2,2	35,7
6	2,4	40,2
7	2,2	39,4
8	2,6	43,7
9	2,6	38,4

Варіант 4		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2,8	14
2	2,4	17,1
3	2,3	18,2
4	2,5	17,4
5	2,7	16,1
6	2,4	18,8
7	2,3	32,2
8	1,9	31
9	2,3	32,4

Варіант 5		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2	35
2	2,3	43,7
3	2,7	31,9
4	2,2	37,3
5	2,4	40,9
6	2,3	38,8
7	2,3	35,7
8	2,6	43,2
9	2,7	30,5

Варіант 6		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2,4	40,2
2	2,2	39,4
3	2,6	43,7
4	2,6	38,4
5	2,3	38,8
6	2,2	39,9
7	2,8	30,1
8	2,8	31,7
9	2,8	37,2

Варіант 7		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2,3	32,1
2	1,9	31
3	2,3	32,4
4	2,5	33,2
5	2,6	31,2
6	2	34,8
7	1,9	35,4
8	2,4	33
9	2,2	34,8

Варіант 8		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2,8	13,8
2	2,7	14,8
3	2,4	16,9
4	2,3	16,8
5	2,5	14,8
6	2,5	17,9
7	2,5	17,6
8	2,4	15,7
9	2,3	15,2

Варіант 9		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2,7	14,9
2	2,5	16,1
3	2,1	19,7
4	2,8	14
5	2,4	17,1
6	2,3	18,2
7	2,5	17,4
8	2,7	16,1
9	2,4	18

Варіант 10		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	30,2	5000
2	32	5200
3	32	5350
4	37	5880
5	30	5430
6	30	5430
7	30	5350
8	29	5740
9	33	5570

Варіант 11		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	29	5350
2	33	2740
3	31	5570
4	30	5530
5	34	6020
6	38	7010
7	31	6420
8	39	7150
9	39,5	7190

Варіант 12		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	5,1	15,7
2	7,2	17
3	2	5,2
4	5,1	17,5
5	10	22,1
6	12	25,8
7	9,4	23
8	6,9	17
9	3,4	9,1

Варіант 13		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	5,4	3,7
2	7,6	8
3	2,3	3,2
4	5,9	2,5
5	11	4,9
6	12,6	4,8
7	10,4	5,1
8	4,9	2,2
9	2,4	1,1

Варіант 14		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	1,4	12,7
2	2,6	18
3	2,3	16,2
4	5,1	25,5
5	6	24,1
6	5,6	24,8
7	10,4	55
8	4,9	33
9	2,4	18,1

Варіант 15		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	0,4	13,7
2	0,6	18
3	0,3	6,2
4	0,9	15,5
5	1	24,1
6	1,6	24,8
7	1,4	25
8	0,6	13
9	0,3	8,1

Варіант 16		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	31,2	50,00
2	32,4	52,02
3	30,2	53,50
4	34,1	58,80
5	30,01	54,30
6	30,06	54,29
7	30,45	52,50
8	29,56	56,43
9	33,01	55,70

Варіант 17		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	2,92	535
2	3,31	274
3	3,13	557
4	3,04	553
5	3,42	602
6	3,89	707
7	3,14	642
8	3,91	715
9	3,95	719

Варіант 18		
<i>n</i>	<i>X_i</i>	<i>Y_i</i>
1	6,1	12,7
2	6,2	15
3	5	4,2
4	4,1	13,5
5	11,2	20,1
6	11,4	22,8
7	10,4	21
8	9,9	15,7
9	6,4	10,1

Варіант 19		
n	X_i	Y_i
1	54	37
2	76	80
3	28	32
4	59	25
5	19	49
6	18	48
7	14	51
8	49	22
9	24	19

Варіант 20		
n	X_i	Y_i
1	1,8	13,7
2	2,4	18,2
3	2,1	12,2
4	5,5	26,5
5	6,2	24,1
6	5,8	26,8
7	10,3	25,5
8	4,7	33,2
9	2,1	18,1

Додаток 2

Дані для математичної статистики

Додаток 2.1

Дані для перевірки за законом Пуассона

№	X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>n</i>	37	37	18	6	2	0	0	0	0	0	0
2		29	36	22	9	3	1	0	0	0	0	0
3		22	33	25	13	5	2	0	0	0	0	0
4		17	30	27	16	7	2	1	0	0	0	0
5		14	27	27	18	9	4	1	0	0	0	0
6		11	24	27	20	11	5	2	0	0	0	0
7		8	21	26	21	13	7	3	1	0	0	0
8		6	18	24	22	15	8	4	2	1	0	0
9		5	15	22	22	17	10	5	2	1	0	0
10		4	13	20	22	18	12	6	3	1	1	0
11		0	4	10	20	28	34	32	26	18	12	8
12		0	4	12	22	32	34	32	26	16	10	6
13		2	6	14	26	34	34	30	22	16	8	4
14		2	6	16	28	36	36	30	20	14	8	4
15		2	8	20	30	36	34	28	20	12	6	4
16		2	10	22	34	38	34	26	20	10	6	2
17		2	12	26	36	38	32	24	14	8	4	2
18		4	14	30	40	40	34	20	12	6	2	2
19		4	18	34	42	38	32	18	10	4	2	0
20		6	22	36	44	38	26	16	8	4	2	0

Додаток 2.2

Дані для перевірки за нормальним законом

Варіант 1

2,37	-0,94	0,58	-0,38	-0,72	0,76	1,55	-0,53	1,41	1,03
-0,06	0,29	0,06	1,40	0,32	1,65	0,61	2,72	-1,03	0,48
0,61	2,05	1,12	-0,94	0,46	1,18	0,93	0,48	0,34	0,48
-0,50	1,58	1,39	2,30	0,83	1,19	-0,48	0,93	1,07	0,84
1,34	1,14	1,48	3,08	2,73	-1,14	-0,48	1,63	1,31	0,08
-0,10	1,52	2,41	0,16	0,31	0,60	2,75	-0,01	0,33	-0,13
0,51	0,81	-0,23	1,26	1,89	0,89	1,93	1,02	2,26	0,31
1,97	2,48	1,88	1,96	1,67	0,08	0,66	0,98	1,91	-0,11
0,67	1,18	2,30	3,15	1,24	0,81	0,73	0,65	0,79	0,63
1,45	1,31	1,42	1,23	1,84	1,99	2,05	2,50	2,55	2,90

Варіант 2

1,60	0,07	0,90	0,39	0,19	0,76	1,29	0,14	1,01	0,27
1,15	0,70	0,56	1,05	0,65	1,37	0,83	1,76	-0,04	0,72
0,96	1,70	1,13	0,19	0,70	1,06	0,96	0,71	0,68	0,66
0,20	1,29	1,01	1,55	0,80	1,19	0,35	0,77	1,15	0,85
1,19	1,11	1,16	2,02	1,88	-0,02	0,50	1,49	1,20	0,54
0,31	1,42	1,54	0,74	0,59	0,83	1,91	0,38	0,56	0,37
0,77	0,80	0,28	1,23	1,26	0,76	1,40	1,15	1,53	0,62
1,36	1,62	1,36	1,40	1,43	0,64	0,84	0,78	1,47	0,47
0,93	1,01	1,54	2,15	1,07	0,81	0,82	0,78	0,85	0,97
1,06	1,16	1,04	1,24	1,35	1,44	1,66	1,69	1,97	1,79

Варіант 3

3,33	0,18	1,52	0,99	0,38	1,74	2,78	0,23	2,20	0,67
2,19	1,46	1,03	2,09	1,38	2,83	1,81	3,53	-0,47	1,25
1,61	3,36	2,41	0,21	1,27	2,29	1,73	1,01	1,49	1,21
0,22	2,67	2,28	3,19	1,62	2,28	0,98	1,88	2,38	1,54
2,18	2,41	2,41	4,29	3,58	-0,27	0,83	2,88	2,21	1,16
0,86	2,85	3,07	1,36	1,33	1,95	3,96	0,67	1,02	0,85
1,96	1,61	0,64	2,46	2,56	1,90	2,88	2,45	3,42	1,23
2,62	3,05	2,64	2,59	2,60	1,28	1,90	1,97	2,85	0,84
1,94	2,28	3,09	4,17	2,02	1,82	1,84	1,97	1,66	1,86
2,40	2,01	2,41	2,47	2,99	2,67	3,47	3,38	3,94	3,54

Варіант 4

2,57	1,10	1,82	1,42	1,14	1,94	2,41	1,07	2,07	1,27
2,25	1,54	1,52	2,16	1,66	2,48	1,89	2,77	0,75	1,71
1,78	2,63	2,01	1,24	1,61	2,19	1,79	1,68	1,65	1,61
1,24	2,40	2,04	2,55	1,82	2,00	1,33	1,84	2,05	1,78

2,23	2,23	2,22	3,18	2,80	0,86	1,42	1,64	2,32	2,55
1,38	2,39	2,70	1,59	1,52	1,77	2,87	1,28	1,57	1,33
1,89	1,78	1,26	2,13	2,35	1,99	2,32	2,06	2,51	1,72
2,40	2,65	2,34	2,26	2,29	1,69	1,84	1,93	2,37	1,31
1,97	2,06	2,69	3,23	2,10	1,76	1,83	1,82	1,91	1,83
2,01	2,13	2,03	2,06	2,49	2,37	2,55	2,65	2,89	2,78

Варіант 5

4,24	1,32	2,80	1,95	1,47	2,55	3,90	1,18	3,36	1,79
3,04	2,11	2,30	3,08	2,32	3,87	2,61	4,90	0,93	2,29
2,64	4,26	3,01	1,06	2,13	3,39	2,60	2,07	2,46	2,22
1,08	3,79	3,17	4,18	2,51	3,39	1,90	2,63	3,37	2,82
3,28	3,04	3,37	5,32	4,73	0,62	1,99	3,97	3,27	2,02
1,65	3,72	4,26	2,00	2,25	2,55	4,78	1,63	2,07	1,92
2,84	2,56	1,75	3,31	3,56	2,67	3,54	3,16	4,06	2,45
3,99	4,43	3,83	3,69	3,56	2,05	2,86	2,61	3,69	1,65
2,96	3,04	4,37	5,23	3,40	2,54	2,54	2,59	2,60	2,77
3,20	3,06	3,14	3,32	3,94	3,94	4,43	4,23	4,98	4,64

Варіант 6

3,71	2,16	2,98	2,40	2,14	2,79	3,29	2,08	3,22	2,31
3,20	2,53	2,56	3,11	2,65	3,26	2,93	3,75	1,86	2,52
2,90	3,59	3,04	2,19	2,56	3,14	2,86	2,51	2,69	2,67
2,03	3,42	3,05	3,54	2,77	3,11	2,48	2,87	3,02	2,81
3,20	3,10	3,04	4,20	3,85	1,93	2,50	3,27	3,17	2,58
2,32	3,48	3,52	2,72	2,51	2,80	3,95	2,46	2,57	2,33
2,85	2,89	2,43	3,22	3,26	2,78	3,36	3,17	3,51	2,73
3,41	3,59	3,28	3,32	3,41	2,54	2,98	2,91	3,42	2,29
2,99	3,08	3,67	4,06	3,06	2,91	2,96	2,95	2,89	3,00
3,24	3,15	3,18	3,16	3,40	3,45	3,61	3,51	3,85	3,76

Варіант 7

5,24	2,29	3,84	2,61	2,01	3,66	4,71	2,36	4,11	2,92
4,44	3,38	3,18	4,08	3,43	4,56	3,83	5,57	1,61	3,14
3,61	5,48	4,34	2,27	3,24	4,37	3,84	3,35	3,16	3,01
2,33	4,97	4,05	5,07	3,55	4,31	2,95	3,53	4,08	3,65
4,43	4,29	4,11	6,07	5,88	1,57	2,82	4,98	4,01	3,34
2,58	4,64	5,19	3,06	3,40	3,66	5,82	2,90	3,30	2,61
3,64	3,97	2,90	4,46	4,89	3,62	4,51	4,45	5,45	3,08
4,65	5,25	4,82	4,85	4,98	3,08	3,80	3,62	4,59	2,86
3,96	4,37	5,41	6,40	4,03	3,92	3,77	3,53	3,54	3,66
4,40	4,50	4,02	4,34	4,99	4,95	5,24	5,37	5,46	5,75

Варіант 8

4,52	3,18	3,86	3,33	3,24	3,82	4,31	3,22	4,22	3,38
4,17	3,71	3,51	4,09	3,71	4,33	3,82	4,93	2,93	3,71
3,81	4,62	4,24	3,05	3,53	4,16	3,86	3,65	3,57	3,63
3,01	4,40	4,10	4,54	3,95	4,03	3,48	3,77	3,86	4,04
4,25	4,05	4,08	5,15	4,89	2,90	3,28	4,28	4,20	3,61
3,45	4,42	4,55	3,63	3,64	3,78	4,86	3,37	3,64	3,40
3,91	3,78	3,36	4,06	4,42	3,93	4,47	4,19	4,50	3,59
4,48	4,64	4,46	4,41	4,36	3,55	3,99	3,78	4,26	3,45
3,86	4,24	4,72	5,11	4,07	3,78	3,99	3,84	3,82	3,99
4,24	4,22	4,17	4,23	4,33	4,34	4,61	4,60	4,81	4,94

Варіант 9

6,25	3,44	4,61	3,67	3,14	4,52	5,88	3,18	5,07	3,94
5,09	4,20	4,38	5,07	4,32	5,55	4,53	6,73	2,92	4,13
4,55	6,42	5,03	3,47	4,01	5,11	4,66	4,14	4,02	4,01
3,37	5,84	5,24	6,05	4,57	5,03	3,66	4,85	5,48	4,72
5,26	5,33	5,45	7,38	6,74	2,60	3,83	5,79	5,21	4,28
3,51	6,01	6,29	4,41	4,15	4,73	6,81	3,68	4,47	4,02
4,66	4,81	3,92	5,15	5,87	3,98	4,98	5,109	6,48	4,07
5,74	6,26	5,56	5,54	5,98	4,22	4,94	4,92	5,97	3,67
4,81	4,45	6,31	7,19	5,25	4,56	4,79	4,86	4,88	4,56
5,02	5,29	5,02	5,01	5,65	5,66	6,11	6,49	6,72	6,86

Варіант 10

5,53	4,12	4,97	4,41	4,16	4,93	5,31	4,18	5,06	4,29
5,23	4,45	4,54	5,24	4,65	5,31	4,77	5,92	3,88	4,61
4,83	5,74	5,13	4,17	4,45	5,14	4,77	4,68	4,66	4,55
4,15	5,42	5,19	5,65	4,83	5,05	4,48	4,95	5,24	4,84
5,15	5,16	5,12	6,07	5,99	3,85	4,43	5,42	5,03	4,56
4,38	5,35	5,61	4,60	4,64	4,80	5,98	4,27	4,63	4,30
4,88	4,78	4,29	5,14	5,35	4,85	5,28	5,03	5,72	4,69
5,35	5,51	5,38	5,34	5,27	4,61	4,96	4,79	5,42	4,50
4,85	5,02	5,70	6,22	5,24	4,80	4,76	4,96	4,84	4,97
5,20	5,01	5,45	5,03	5,49	5,36	5,57	5,56	5,94	5,86

Варіант 11

7,17	4,34	5,87	4,65	4,12	5,81	6,85	4,29	6,47	4,69
6,29	5,14	5,07	6,20	5,27	6,86	5,66	7,98	3,59	5,15
5,76	7,16	6,24	4,13	5,11	6,04	5,86	5,04	5,10	5,17
4,31	6,58	6,49	7,48	5,88	6,12	4,56	5,81	6,19	5,93

6,09	6,23	6,38	8,37	7,56	3,90	4,69	6,75	6,05	5,20
4,65	6,96	7,19	5,35	5,23	5,94	7,55	4,72	5,41	4,89
5,86	5,94	6,67	6,07	6,58	5,62	6,74	6,25	7,14	5,11
6,80	7,19	4,61	6,67	6,90	5,12	5,74	5,77	6,57	4,93
5,88	6,41	4,34	8,05	6,18	5,68	5,59	5,69	5,79	4,67
6,07	6,13	6,34	6,05	6,84	6,65	7,05	7,06	7,97	7,88

Варіант 12

6,62	5,14	5,78	5,40	5,13	5,98	6,49	5,19	6,03	5,38
6,02	5,74	5,63	6,20	5,71	6,33	5,91	6,91	4,78	5,59
5,94	6,55	6,22	5,11	5,74	6,10	5,82	5,54	5,64	5,57
5,20	6,48	6,03	6,66	5,93	6,03	5,32	5,82	6,21	5,81
6,02	6,10	6,18	7,23	6,76	4,83	5,49	6,39	6,17	5,68
5,35	6,31	6,51	5,68	5,74	5,82	6,83	5,31	5,66	5,46
5,81	5,97	5,27	6,01	6,29	5,91	6,47	5,68	6,37	5,60
6,33	6,62	6,35	6,33	6,47	5,61	5,84	5,87	6,37	5,31
5,84	6,12	6,65	7,17	6,04	5,75	5,95	5,87	5,84	5,87
6,09	6,13	5,75	6,21	6,42	6,29	6,75	6,59	6,98	6,80

Варіант 13

9,58	8,09	9,00	8,31	8,01	8,81	9,25	8,05	9,24	8,45
9,07	8,53	8,64	9,22	8,71	9,40	8,86	9,88	7,79	8,65
8,93	9,60	9,07	8,01	8,70	9,11	8,79	8,63	8,68	8,74
8,18	9,37	9,16	9,68	8,84	9,12	8,33	8,76	9,00	8,88
9,07	9,19	9,18	10,03	9,93	7,96	8,45	9,30	9,22	8,54
8,30	9,34	9,74	8,68	8,74	8,99	9,91	8,31	8,66	8,35
8,87	8,78	8,33	9,17	9,29	9,00	9,47	9,11	9,37	8,60
9,38	9,68	9,35	9,26	9,47	8,66	8,84	8,89	9,46	8,50
8,87	9,05	9,65	10,20	9,04	8,96	8,95	8,87	8,78	8,82
9,16	9,19	9,11	9,18	9,42	9,41	9,75	9,69	9,83	9,80

Варіант 14

11,36	8,41	9,94	8,78	8,37	9,56	10,58	8,37	10,45	8,75
10,29	9,29	9,38	10,31	9,05	10,62	9,64	11,83	7,87	9,28
9,79	11,04	10,43	8,09	9,07	10,40	9,65	9,14	9,39	9,07
8,14	10,59	10,02	11,47	9,69	10,19	8,78	9,86	10,50	9,59
10,39	10,37	10,42	12,10	11,65	7,99	8,90	10,60	10,34	9,08
8,52	10,91	11,11	9,34	9,06	9,79	11,56	8,79	9,02	8,46
9,90	9,71	8,67	10,05	10,89	9,87	10,59	10,20	11,41	9,46
10,81	11,28	11,20	10,56	10,77	9,46	9,98	10,01	10,92	8,97
9,93	10,05	10,79	12,24	10,21	9,93	9,56	9,74	9,56	9,81
10,41	10,05	10,36	10,19	10,95	10,59	8,75	11,47	11,64	11,79

Варіант 15

14,24	12,29	13,84	12,61	12,01	13,66	14,71	12,36	14,11	12,92
13,44	11,38	13,18	14,08	13,43	14,56	13,83	15,57	11,61	13,14
12,61	12,48	14,34	12,27	13,24	14,37	13,84	13,35	13,16	13,01
11,33	14,97	14,05	15,07	13,55	14,31	12,95	13,53	14,08	13,65
13,43	13,29	14,11	16,07	15,88	11,57	12,82	14,98	14,01	13,34
11,58	13,64	15,19	13,06	13,40	13,66	15,82	12,90	13,30	12,61
12,64	12,97	12,90	14,46	14,89	13,62	14,51	14,45	15,45	13,08
13,65	14,25	14,82	14,85	14,98	13,08	13,80	13,62	14,59	12,86
12,96	13,37	15,41	16,40	14,03	13,92	13,77	13,53	13,54	13,66
13,40	13,50	14,02	14,34	14,99	14,95	15,24	15,37	15,46	15,75

Варіант 16

14,52	13,18	13,86	13,33	13,24	13,82	14,31	13,22	14,22	13,38
14,17	13,71	13,51	14,09	13,71	14,33	13,82	14,93	12,93	13,71
13,81	14,62	14,24	13,05	13,53	14,16	13,86	13,65	13,57	13,63
13,01	14,40	14,10	14,54	13,95	14,03	13,48	13,77	13,86	14,04
14,25	14,05	14,08	15,15	14,89	12,90	13,28	14,28	14,20	13,61
13,45	14,42	14,55	13,63	13,64	13,78	14,86	13,37	13,64	13,40
13,91	13,78	13,36	14,06	14,42	13,93	14,47	14,19	14,50	13,59
14,48	14,64	14,46	14,41	14,36	13,55	13,99	13,78	14,26	13,45
13,86	14,24	14,72	15,11	14,07	13,78	13,99	13,84	13,82	13,99
14,24	14,22	14,17	14,23	14,33	14,34	14,61	14,60	14,81	14,94

Варіант 17

16,25	13,44	14,61	13,67	13,14	14,52	15,88	13,18	15,07	13,94
15,09	14,20	14,38	15,07	14,32	15,55	14,53	16,73	12,92	14,13
14,55	16,42	15,03	13,47	14,01	15,11	14,66	14,14	14,02	14,01
13,37	15,84	15,24	16,05	14,57	15,03	13,66	14,85	15,48	14,72
15,26	15,33	15,45	17,38	16,74	12,60	13,83	15,79	15,21	14,28
13,51	16,01	16,29	14,41	14,15	14,73	16,81	13,68	14,47	14,02
14,66	14,81	13,92	15,15	15,87	13,98	14,98	15,19	16,48	14,07
15,74	16,26	15,56	15,54	15,98	14,22	14,94	14,92	15,97	13,67
14,81	14,45	16,31	17,19	15,25	14,56	14,79	14,86	14,88	14,56
15,02	15,29	15,02	15,01	15,65	15,66	16,11	16,49	16,72	16,86

Варіант 18

3,33	1,14	1,62	0,90	0,86	1,74	2,78	0,23	2,20	0,67
2,19	1,46	1,08	2,09	1,38	2,83	1,81	3,53	-0,47	1,25
1,61	3,36	2,71	0,81	1,27	2,29	1,73	1,02	1,49	1,21
0,22	2,67	2,28	3,19	1,63	2,26	0,98	1,88	2,38	1,54
2,18	2,41	2,41	4,29	3,59	-0,27	0,83	2,87	2,21	1,16
0,86	2,85	3,07	1,36	1,33	1,95	3,96	0,67	1,02	0,85
1,96	1,61	0,64	2,47	2,56	1,90	2,87	2,45	3,42	1,23
2,62	3,06	2,64	2,59	2,60	1,84	1,90	1,97	2,85	0,84
1,94	2,85	3,09	4,17	2,02	2,97	1,84	1,96	1,66	1,86
2,40	2,01	2,75	2,47	2,42	2,67	3,48	3,38	3,94	3,54

Варіант 19

9,48	10,09	10,00	8,31	9,01	10,81	9,25	8,05	9,24	10,45
8,27	10,53	9,64	9,22	9,71	9,49	8,86	9,88	7,79	8,65
8,33	10,60	10,07	8,01	9,70	10,11	8,79	8,63	8,68	10,74
8,78	9,89	10,16	9,68	9,84	9,82	8,33	8,76	10,00	8,88
9,57	9,69	9,19	10,03	9,93	8,96	8,45	9,30	10,22	8,54
8,70	9,74	9,14	8,68	10,74	10,99	9,91	8,31	8,66	8,35
9,27	9,78	8,83	9,17	9,89	9,00	9,47	9,11	9,37	10,60
10,39	10,68	9,25	9,26	9,77	9,66	8,84	8,89	9,46	10,50
10,85	10,05	9,95	10,20	9,84	8,96	8,95	8,87	8,78	8,82
9,56	10,19	9,91	9,18	9,92	10,41	9,75	9,69	9,83	10,80

Варіант 20

11,26	8,49	10,94	9,78	8,37	10,55	11,58	8,37	10,45	8,79
11,29	9,29	9,38	10,31	9,05	10,62	9,64	11,83	8,87	9,48
10,79	12,04	11,43	9,09	9,07	11,41	10,65	9,14	9,39	10,07
9,14	11,59	10,02	11,47	9,69	10,19	8,78	9,86	11,50	9,59
11,39	11,37	11,42	13,10	11,65	9,99	9,90	10,60	10,34	10,08
9,52	11,91	11,11	10,34	9,06	10,79	11,56	8,79	9,92	9,49
10,90	10,71	9,67	10,05	10,89	9,87	11,59	10,20	11,41	9,26
11,81	12,28	12,20	11,56	10,77	10,46	9,98	10,01	12,92	10,97
10,93	10,05	10,79	12,24	10,21	9,93	10,56	9,74	9,59	10,81
11,41	10,05	11,36	11,19	10,95	11,59	8,75	11,47	11,64	11,79

Дані експериментальних вимірювань

Дані вимірювань при стабільній подачі фарби та зволожувального розчину

Відбиток	3 ділянка				4 ділянка				5 ділянка				6 ділянка			
	ΔE	D	80	40												
5	16,24	0,89	4	5	16,99	0,88	5	5	14,15	0,96	4	6	10,83	1,06	5	6
5	11,75	0,96	4	5	13,38	0,95	4	5	12,51	0,99	4	5	9,78	1,08	5	6
10	16,11	0,89	5	7	16,86	0,87	5	6	14,45	0,93	5	6	11,38	1,03	5	7
10	12,84	0,96	4	6	13,84	0,92	4	5	12,57	0,96	4	6	9,84	1,06	5	7
15	16,31	0,87	5	7	17,10	0,86	5	7	14,09	0,94	5	7	11,26	1,03	6	7
15	12,73	0,95	5	6	14,17	0,91	5	6	13,34	0,96	4	6	10,22	1,05	5	7
20	15,37	0,89	4	6	15,99	0,88	5	6	14,11	0,93	5	6	11,20	1,02	5	6
20	12,76	0,98	5	5	13,64	0,93	4	6	12,79	0,99	4	6	10,43	1,06	5	6
25	12,96	0,95	4	7	12,90	0,96	5	6	11,37	1,01	5	7	9,06	1,09	5	7
25	10,75	1,02	5	7	12,09	0,99	5	7	11,15	1,02	5	7	8,90	1,09	6	8
30	13,93	0,93	5	7	14,47	0,92	5	6	12,88	0,97	5	7	9,99	1,06	5	7
30	11,53	0,99	5	6	12,96	0,96	4	6	11,97	1,01	4	6	9,63	1,08	5	7
35	14,46	0,91	5	7	15,79	0,89	5	6	13,64	0,94	5	7	10,36	1,05	5	7
35	12,05	0,97	5	6	14,02	0,93	5	6	12,96	0,96	4	6	10,13	1,06	5	7
40	14,59	0,91	5	7	16,20	0,86	5	6	13,90	0,93	5	7	11,15	1,02	5	7
40	12,10	0,97	5	7	13,40	0,94	4	6	12,96	0,96	4	6	10,49	1,04	5	7

Відбиток	7 ділянка				8 ділянка				9 ділянка				10 ділянка			
	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40
5	8,70	1,13	5	7	5,68	1,26	5	7	3,28	1,36	6	8	2,34	1,44	6	9
5	6,76	1,18	5	6	4,37	1,29	6	7	2,93	1,40	6	8	2,97	1,53	7	10
10	8,62	1,12	5	7	5,84	1,22	5	8	3,32	1,34	6	8	1,59	1,45	7	10
10	7,10	1,16	5	7	4,79	1,28	6	8	2,79	1,37	7	9	2,62	1,52	8	10
15	8,46	1,11	6	9	5,69	1,23	6	9	3,01	1,34	7	9	1,73	1,46	7	10
15	7,60	1,17	5	8	5,00	1,26	6	9	3,14	1,40	7	9	3,14	1,54	8	11
20	8,43	1,12	6	7	5,43	1,23	5	8	3,03	1,35	6	8	1,85	1,43	7	10
20	7,48	1,16	5	7	4,61	1,28	6	8	2,80	1,40	6	9	2,94	1,54	8	11
25	6,97	1,16	6	9	4,92	1,26	6	9	2,87	1,37	6	10	2,34	1,46	8	11
25	6,32	1,19	6	9	4,73	1,29	6	9	3,06	1,41	8	11	3,18	1,55	9	13
30	7,81	1,14	5	7	4,97	1,26	6	8	2,99	1,37	6	9	2,48	1,48	7	10
30	7,35	1,16	5	8	4,76	1,31	6	9	2,77	1,43	7	11	2,66	1,52	9	12
35	8,03	1,14	5	7	5,42	1,25	6	9	3,20	1,38	6	10	2,78	1,49	7	11
35	7,66	1,17	5	7	4,65	1,29	6	9	3,07	1,42	7	9	3,51	1,59	9	12
40	8,71	1,11	6	7	5,74	1,23	6	9	3,37	1,36	6	9	2,75	1,48	7	10
40	7,58	1,15	5	7	5,02	1,27	6	8	2,97	1,43	7	10	3,31	1,58	8	11

Відбиток	11 ділянка				12 ділянка				13 ділянка				14 ділянка			
	ΔE	D	80	40												
5	2,68	1,52	7	10	3,31	1,58	8	10	3,64	1,55	9	10	3,54	1,57	8	10
5	4,03	1,65	9	11	4,76	1,69	9	11	4,03	1,69	9	12	4,56	1,68	10	12
10	2,11	1,52	7	10	3,19	1,53	9	11	3,24	1,55	9	11	2,94	1,55	9	11
10	3,66	1,64	9	12	4,58	1,70	10	12	4,58	1,65	9	12	4,48	1,66	10	12
15	2,38	1,53	8	11	3,18	1,56	9	12	2,97	1,55	9	12	2,41	1,52	9	11
15	3,88	1,65	9	12	4,88	1,68	10	13	4,67	1,64	10	13	4,52	1,64	9	12
20	2,47	1,53	7	11	3,41	1,58	9	11	3,19	1,55	9	11	2,59	1,55	9	11
20	4,17	1,66	9	12	4,88	1,73	10	12	4,97	1,70	9	13	4,42	1,67	10	14
25	3,02	1,54	8	11	3,54	1,57	9	12	3,28	1,56	9	12	2,55	1,50	9	12
25	4,29	1,65	10	13	4,80	1,68	10	14	4,35	1,62	10	14	3,87	1,61	10	12
30	3,34	1,56	8	11	4,04	1,60	9	11	3,66	1,57	9	11	2,99	1,54	8	11
30	4,40	1,68	9	13	5,08	1,69	10	13	4,33	1,63	10	12	3,93	1,65	10	13
35	3,59	1,55	8	12	4,18	1,60	9	12	3,93	1,57	9	11	3,06	1,53	8	10
35	4,65	1,67	10	14	5,66	1,74	11	15	4,76	1,68	9	13	4,35	1,66	10	12
40	3,48	1,53	8	13	3,64	1,58	10	12	3,89	1,56	9	12	3,13	1,53	8	12
40	4,76	1,67	10	14	5,39	1,72	10	14	4,90	1,66	10	13	4,16	1,65	10	12

Відбиток	15 ділянка				16 ділянка				17 ділянка			
	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40
5	3,46	1,55	8	9	3,18	1,51	8	9	3,12	1,48	7	9
5	4,40	1,68	9	10	3,59	1,65	8	10	3,10	1,59	8	9
10	2,60	1,52	8	10	2,13	1,48	8	9	2,33	1,44	7	9
10	3,57	1,62	10	11	3,15	1,57	8	10	2,60	1,52	8	9
15	1,87	1,49	7	11	1,84	1,46	7	10	1,92	1,41	7	10
15	3,53	1,62	9	12	2,93	1,56	8	9	2,57	1,51	8	9
20	2,04	1,49	7	10	1,75	1,44	7	9	2,09	1,39	7	8
20	3,54	1,59	9	12	2,63	1,55	8	11	2,28	1,51	8	9
25	2,11	1,45	7	11	2,47	1,41	7	9	3,37	1,33	7	10
25	3,15	1,55	10	12	2,31	1,50	8	10	2,78	1,42	7	9
30	2,25	1,48	7	9	2,67	1,38	7	9	3,62	1,33	6	9
30	3,03	1,57	9	11	2,06	1,51	7	10	2,76	1,41	7	9
35	2,43	1,47	6	10	2,92	1,37	7	8	4,21	1,30	7	8
35	3,21	1,56	8	11	2,32	1,47	7	10	3,45	1,40	7	9
40	2,55	1,44	7	10	2,97	1,36	7	9	4,31	1,29	6	10
40	3,00	1,54	8	11	2,23	1,44	7	9	3,40	1,36	7	9

Відбиток	18 ділянка				19 ділянка				20 ділянка			
	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40
5	3,54	1,42	7	8	3,56	1,39	7	8	4,92	1,28	7	8
5	2,45	1,55	8	9	2,16	1,51	6	8	2,41	1,46	7	7
10	2,62	1,41	7	11	3,09	1,37	7	8	3,57	1,34	6	8
10	2,27	1,50	7	9	2,44	1,43	6	8	2,62	1,42	7	8

15	3,15	1,35	7	9	4,07	1,29	7	9	4,80	1,25	6	8
15	1,36	1,46	7	9	2,63	1,35	6	8	3,40	1,35	6	8
20	3,27	1,32	6	8	4,46	1,28	6	8	4,59	1,26	5	7
20	2,35	1,44	7	9	3,16	1,37	6	8	3,62	1,36	6	8
25	4,34	1,27	6	9	5,20	1,24	6	8	5,47	1,22	6	8
25	2,77	1,35	7	10	4,22	1,30	7	9	3,97	1,30	7	8
30	4,97	1,25	6	9	5,82	1,22	5	8	6,00	1,21	5	8
30	3,48	1,32	6	8	4,80	1,28	6	7	4,60	1,29	6	8
35	5,82	1,22	5	8	6,77	1,18	6	8	6,90	1,18	5	8
35	4,28	1,30	6	8	5,76	1,24	5	7	5,28	1,28	6	7
40	6,11	1,20	5	8	7,41	1,15	5	8	7,55	1,14	5	8
40	4,98	1,26	6	8	6,29	1,20	5	7	5,32	1,24	5	7

**Дані вимірювань при коригуванні подачі фарби
автоматизованою системою контролю параметрів відбитка**

Відбиток	3 ділянка				4 ділянка				5 ділянка				6 ділянка			
	ΔE	D	80	40												
1	11,97	1,02	6	9	13,19	0,98	7	9	11,67	1,03	7	9	9,36	1,11	7	9
1	9,90	1,08	6	8	11,35	1,04	6	8	11,10	1,07	6	8	8,70	1,14	6	9
101	11,25	1,05	6	10	12,45	1,01	6	9	10,96	1,07	7	10	8,58	1,15	7	10
101	9,45	1,10	6	8	11,42	1,06	6	9	10,74	1,09	6	9	8,50	1,16	7	10
201	11,96	1,03	6	10	12,37	1,02	6	9	10,97	1,06	7	10	8,69	1,14	7	10
201	9,54	1,09	6	8	11,04	1,06	6	9	10,39	1,10	6	9	8,09	1,16	7	10
301	9,23	1,11	7	10	9,96	1,10	6	9	8,20	1,15	7	10	6,42	1,23	7	10
301	7,38	1,18	7	9	8,25	1,15	6	9	7,82	1,20	6	11	5,54	1,25	8	10
401	8,34	1,15	7	11	7,77	1,16	8	13	6,81	1,21	7	11	4,98	1,28	8	13
401	5,41	1,25	8	10	6,76	1,23	7	10	5,70	1,26	7	10	4,23	1,33	8	12

Відбиток	7 ділянка				8 ділянка				9 ділянка				10 ділянка			
	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40
1	7,08	1,19	7	10	4,60	1,29	7	10	1,83	1,41	8	12	1,02	1,53	9	15
1	6,43	1,22	7	10	3,80	1,33	7	11	0,76	1,49	9	13	1,78	1,61	10	14
101	6,35	1,23	7	12	3,77	1,33	8	12	1,74	1,43	8	14	1,38	1,56	10	16
101	6,10	1,22	7	11	3,23	1,34	8	12	0,65	1,46	9	17	1,63	1,63	11	16
201	6,70	1,21	7	11	3,98	1,33	8	12	1,60	1,43	9	14	1,31	1,55	11	15
201	5,72	1,27	7	11	3,35	1,36	8	13	0,67	1,51	10	13	1,98	1,64	11	16
301	4,82	1,29	7	11	3,36	1,35	8	14	1,32	1,45	8	14	1,04	1,51	10	16
301	4,33	1,33	8	11	2,64	1,41	8	12	0,59	1,52	9	13	1,82	1,63	11	15
401	4,03	1,31	8	12	2,49	1,38	9	14	1,34	1,44	9	14	1,12	1,51	11	17
401	3,36	1,37	8	11	1,99	1,42	8	13	0,51	1,52	10	14	1,52	1,59	11	16

Відбиток	11 ділянка				12 ділянка				13 ділянка				14 ділянка			
	ΔE	D	80	40												
1	3,01	1,64	10	15	3,44	1,61	12	16	2,34	1,57	11	15	0,99	1,53	10	14
1	3,57	1,69	12	15	4,44	1,75	12	16	3,54	1,67	11	15	2,02	1,62	11	14
101	3,42	1,63	11	18	4,01	1,68	12	18	2,27	1,59	12	17	0,62	1,50	11	14
101	4,04	1,76	13	17	4,33	1,75	13	18	2,63	1,66	11	16	1,00	1,58	11	15
201	3,06	1,64	11	18	4,27	1,70	12	17	2,48	1,60	11	16	0,67	1,53	10	15
201	4,40	1,77	13	17	4,79	1,81	13	17	3,07	1,69	11	16	1,17	1,60	11	15
301	2,28	1,60	10	17	2,23	1,59	11	16	0,95	1,54	11	17	1,50	1,46	9	13
301	3,24	1,70	12	17	3,26	1,72	13	17	1,81	1,63	10	16	0,52	1,55	10	14
401	2,05	1,58	11	19	1,91	1,57	11	16	0,58	1,49	10	17	1,75	1,43	10	15
401	2,32	1,67	11	17	2,58	1,65	11	16	1,17	1,56	10	15	0,97	1,49	9	15

Відбиток	15 ділянка				16 ділянка				17 ділянка			
	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40
1	1,46	1,42	9	12	3,65	1,33	8	12	4,96	1,28	7	11
1	0,54	1,50	9	13	1,81	1,42	9	12	3,58	1,34	7	11
101	2,74	1,38	8	13	5,88	1,24	8	12	8,11	1,17	7	11
101	2,16	1,42	9	13	4,90	1,33	8	12	6,86	1,21	7	10
201	2,78	1,38	8	12	5,81	1,26	7	11	7,98	1,17	7	11
201	2,21	1,43	9	13	4,57	1,32	8	11	6,75	1,23	8	11
301	4,05	1,31	8	13	6,13	1,24	7	11	7,86	1,17	7	11
301	2,73	1,39	9	12	5,39	1,31	8	11	6,88	1,22	7	11
401	4,19	1,32	8	13	5,54	1,26	8	12	6,27	1,22	8	12
401	2,62	1,40	9	13	4,29	1,32	8	11	5,25	1,26	8	11

Відбиток	18 ділянка				19 ділянка				20 ділянка			
	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40	ΔE	D	80	40
1	6,50	1,22	7	11	8,73	1,13	7	10	9,80	1,10	6	9
1	5,75	1,27	7	9	7,92	1,20	6	9	8,04	1,19	6	9
101	10,41	1,04	7	10	11,83	1,04	7	10	12,89	1,00	7	10
101	9,43	1,06	6	9	11,20	1,05	6	9	10,85	1,06	6	9
201	10,62	1,07	7	11	11,87	1,04	7	10	12,72	1,01	6	10
201	9,78	1,15	7	10	10,98	1,06	6	9	11,03	1,06	6	10
301	9,59	1,10	7	11	10,78	1,07	7	10	12,02	1,03	6	9
301	8,47	1,15	6	10	9,93	1,11	6	9	10,52	1,09	6	8
401	7,89	1,16	8	12	8,66	1,14	7	11	10,22	1,09	7	10
401	6,56	1,22	8	12	7,52	1,18	6	10	8,59	1,15	7	9

Додаток 4

Таблиці значень основних функцій та розподілів

Таблиця 1

Таблиця значень функції $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3653	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	2780	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2035	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0941	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0271	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0159	0155	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

Таблиця 2

Таблиця значень функції Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1,3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1,5	43319	43448	43574	43699	43872	43943	44062	44179	44295	44408
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48860	48899
2,3	48928	48966	48983	49010	49036	49061	49086	49110	49134	49158
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861
3,0	0,49865		3,1	49903	3,2	49931	3,3	49952	3,4	49966
3,5	49977		3,6	49984	3,7	49989	3,8	49993	3,9	49995
4,0	499968									
4,5	499997									
5,0	49999997									

Таблиця значень χ^2 в залежності від k і рівня значущості α

Кількість ступенів вільності k	α 0,95	α 0,90	α 0,50	α 0,30	α 0,20	α 0,10	α 0,05	α 0,025	α 0,01
1	0,004	0,016	0,455	1,074	1,642	2,71	3,84	5,0	6,6
2	0,103	0,211	1,386	2,41	3,22	4,60	5,99	7,4	9,2
3	0,352	0,584	2,37	3,67	4,64	6,25	7,82	9,4	11,3
4	0,711	1,064	3,36	4,88	5,99	7,78	9,49	11,1	13,3
5	1,145	1,61	4,35	6,06	7,29	9,24	11,07	12,8	15,1
6	1,635	2,20	5,35	7,23	8,56	10,64	12,59	14,4	16,8
7	2,17	2,83	6,35	8,38	9,80	12,02	14,07	16,0	18,5
8	2,73	3,49	7,34	9,52	11,03	13,36	15,51	17,5	20,1
9	3,32	4,17	8,34	10,66	12,24	14,68	16,92	19,0	21,7
10	3,94	4,86	9,34	11,78	13,44	15,99	18,31	20,5	23,2
11	4,58	5,58	10,34	12,90	14,63	17,28	19,68	21,9	24,7
12	5,23	6,30	11,34	14,01	15,84	18,55	21,0	23,3	26,2
13	5,89	7,04	12,34	15,12	16,98	19,81	22,4	24,7	27,7
14	6,57	7,79	13,34	16,22	18,15	21,1	23,7	26,1	29,1
15	7,26	8,55	14,34	17,32	19,31	22,3	25,0	27,5	30,6
16	7,96	9,31	15,34	18,42	20,5	23,5	26,3	28,8	32,0
17	8,67	10,08	16,34	19,51	21,6	24,8	27,6	30,2	33,4
18	9,39	10,86	17,34	20,6	22,8	26,0	28,9	31,5	34,8
19	10,11	11,65	18,34	21,7	23,9	27,2	30,1	32,9	36,2
20	10,85	12,44	19,34	22,8	25,0	28,4	31,4	34,2	37,6
21	11,59	13,24	20,3	23,9	26,2	29,6	32,7	35,5	38,9
22	12,34	14,04	21,3	24,9	27,3	30,8	33,9	36,8	40,3
23	13,09	14,85	22,3	26,0	28,4	32,0	35,2	38,1	41,6
24	13,85	15,66	23,3	27,0	29,6	33,2	36,4	39,4	43,0
25	14,61	16,47	24,3	28,2	30,7	34,4	37,7	40,6	44,3
26	15,38	17,29	25,3	29,2	31,8	35,6	38,9	41,9	45,6
27	16,15	18,11	26,3	30,3	32,9	36,7	40,1	43,2	47,0
28	16,93	18,94	27,3	31,4	34,0	37,9	41,3	44,5	48,3
29	17,71	19,77	28,3	32,5	35,1	39,1	42,6	45,7	49,6
30	18,49	20,60	29,3	33,5	36,2	40,3	43,8	47,0	50,9

Таблиця значень $t_\gamma = t(k, \gamma)$ (розділ Стьюдента)

Кількість ступенів вільності	$\gamma = 1 - \alpha$					
	k	0,9	0,95	0,98	0,99	0,998
1	6,31	12,7	31,82	63,7	318,3	637,0
2	2,92	4,30	6,97	9,92	22,33	31,6
3	2,35	3,18	4,54	5,84	10,21	12,9
4	2,13	2,78	3,75	4,60	7,17	8,61
5	2,01	2,57	3,37	4,03	5,89	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	5,21	5,96
7	1,89	2,37	3,00	3,50	4,79	5,40
8	1,86	2,31	2,90	3,36	4,50	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	4,30	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	4,14	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	4,03	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,06	3,93	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,85	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,79	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,73	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,69	4,01
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,65	3,96
18	1,74	2,10	2,55	2,88	3,61	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,58	3,88
20	1,73	2,09	2,53	2,85	3,55	3,85
21	1,72	2,08	2,52	2,83	3,53	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,51	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,49	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	3,47	3,75
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,45	3,72
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,44	3,71
27	1,71	2,05	2,47	2,77	3,42	3,69
28	1,70	2,05	2,47	2,76	3,41	3,67
29	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,39	3,65
40	1,68	20,2	2,42	2,70	3,31	3,55
60	1,67	2,00	2,39	2,66	3,23	3,46
120	1,66	1,98	2,36	2,62	3,17	3,37
∞	1,64	1,96	2,33	2,58	3,09	3,29

Критичні точки розподілу F Фішера-СnedекораРівень значущості $\alpha = 0,01$

k_2	k_1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4052	4999	5403	5625	5764	5889	5928	5981	6022	6056	6082	6106
2	98,49	99,01	90,17	99,25	99,33	99,30	99,34	99,36	99,36	99,40	99,41	99,42
3	34,12	30,81	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,34	27,23	27,13	27,05
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	15,54	14,45	14,37
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,45	10,27	10,15	10,05	9,96	9,89
6	13,74	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,79	7,72
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	7,00	6,84	6,71	6,62	6,54	6,47
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,19	6,03	5,91	5,82	5,74	5,67
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,62	5,47	5,35	5,26	5,18	5,11
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,21	5,06	4,95	4,85	4,78	4,71
11	9,86	7,20	6,22	5,67	5,32	5,07	4,88	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,65	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16
13	9,07	6,70	5,74	5,20	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	4,02	3,96
14	8,86	6,51	5,56	5,03	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,86	3,80
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,73	3,67
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,61	3,55
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,52	3,45

Рівень значущості $\alpha = 0,05$

k_2	k_1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,36	19,37	19,38	19,37	19,40	19,41
3	10,12	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,88	8,84	8,81	8,78	8,76	8,74
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,93	5,91
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,78	4,74	4,70	4,68
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,63	3,60	3,57
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,34	3,31	3,28
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,13	3,10	3,07
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,20	3,14	3,07	3,02	2,97	2,94	2,91
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,86	2,82	2,79
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,92	2,85	2,80	2,76	2,72	2,69
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,84	2,77	2,72	2,67	2,63	2,60
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,77	2,70	2,65	2,60	2,56	2,53
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,70	2,64	2,59	2,55	2,51	2,48
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,45	2,42
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,62	2,55	2,50	2,45	2,41	2,38

$$\text{Значення } p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

k	λ								
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065	0,5488	0,4966	0,4493	0,4066
1	0,0905	0,1637	0,2222	0,2681	0,3033	0,3293	0,3476	0,3595	0,3659
2	0,0045	0,0164	0,0333	0,0536	0,0758	0,0988	0,1217	0,1438	0,1647
3	0,0002	0,0011	0,0033	0,0072	0,0126	0,0198	0,0284	0,0383	0,0494
4		0,0001	0,0003	0,0007	0,0016	0,0030	0,0050	0,0077	0,0111
5			0,0001	0,0002	0,0004	0,0007	0,0012	0,0020	
6				0,0001	0,0002	0,0003	0,0001	0,0002	0,0003
k	λ								
	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
0	0,3679	0,1353	0,0498	0,0183	0,0067	0,0025	0,0009	0,0003	0,0001
1	0,3679	0,2707	0,1494	0,0733	0,0337	0,0149	0,0064	0,0027	0,0011
2	0,1839	0,2707	0,2240	0,1465	0,0842	0,0446	0,0223	0,0107	0,0050
3	0,0613	0,1804	0,2240	0,1954	0,1404	0,0892	0,0521	0,0286	0,0150
4	0,0153	0,0902	0,1680	0,1954	0,1755	0,1339	0,0912	0,0573	0,0337
5	0,0031	0,0361	0,1008	0,1563	0,1755	0,1606	0,1277	0,0916	0,0607
6	0,0005	0,0120	0,0504	0,1042	0,1462	0,1606	0,1490	0,1221	0,0911
7	0,0001	0,0034	0,0216	0,0595	0,1044	0,1377	0,1490	0,1396	0,1171
8		0,0009	0,0081	0,0298	0,0653	0,1033	0,1304	0,1396	0,1318
9			0,0002	0,0027	0,0132	0,0363	0,0688	0,1014	0,1241
10				0,0008	0,0053	0,0181	0,0413	0,0710	0,0993
11					0,0019	0,0082	0,0225	0,0452	0,0722
12						0,0006	0,0034	0,0113	0,0264
13							0,0002	0,0013	0,0052
14								0,0001	0,0005
15									0,0002
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

Список використаної літератури

1. Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін – К., ЦУЛ , 2002. – 448 с.
2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 1997. – 400 с.
3. Іванюта І. Д. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики / І. Д. Іванюта, В. І. Рибалка, І. А. Рудоміно-Дусятська. – К.: Слово, 2003.–272с.
4. Н. С. Пискунов. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов, т.2: Учебное пособие для втузов. –М., Наука, 1985.– 560 с.
5. Кушлик-Дивульська О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст]: навч. посіб. / О.І. Кушлик-Дивульська, Н.В. Поліщук, Б.П. Орел та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 136 с.
6. Коханівський О.П. Завдання для індивідуальної роботи з математичної статистики (для студентів видавничо-поліграфічного факультету)./ О.П. Коханівський, Б.П. Орел, В.А. Шовський. – К., НТУУ «КПІ», 1999. –40с.
7. Коханівський О.П., Кушлик О.І., Орел Б.П., Поліщук Н.В. Збірник задач з теорії ймовірностей (для студентів видавничо-поліграфічного факультету).—К., НТУУ «КПІ», 1999.
8. Кушлик-Дивульська О. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. / О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел, П. І.Штабалюк.– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 212 с.

Зміст

Передмова.....	4
<i>Лабораторна робота № 1.</i> Елементи комбінаторики. Класичне означення ймовірностей. Основні теореми ймовірностей.....	5
<i>Лабораторна робота № 2.</i> Послідовні незалежні випробування. Формула Бернуллі.....	14
<i>Лабораторна робота № 3.</i> Закони розподілу та числові характеристики дискретних випадкових величин.....	23
<i>Лабораторна робота № 4.</i> Закони розподілу та числові характеристики неперервних випадкових величин.....	41
<i>Лабораторна робота № 5.</i> Вибірка, її характеристики. Точкові оцінки числових характеристик випадкових величин. Побудова надійних інтервалів... <td>58</td>	58
<i>Лабораторна робота № 6.</i> Обчислення коефіцієнта кореляції та перевірка його статистичної значущості. Побудова ліній регресії.....	82
<i>Лабораторна робота № 7.</i> Перевірка законів розподілу випадкових величин: розподіл з рівномірною щільністю та розподіл Пуассона.....	106
<i>Лабораторна робота № 8.</i> Статистична перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу.....	118
Додатки.....	137
Додаток 1. Індивідуальні завдання для лабораторних робіт.....	137
Додаток 2. Дані для математичної статистики.....	143
Додаток 3. Дані експериментальних вимірювань.....	150
Додаток 4. Таблиці значень основних функцій та розподілів.....	154
Список використаної літератури.....	160